

Voor en na



Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan zal de plastisch chirurg deze graag tijdens het spreekuur met u doornemen. Ook de kosten van de operatie en een eventuele terugbetaling door de mutualiteit of verzekeraar zullen dan met u worden met besproken.

Voorstelling

Plastisch chirurgen

Dr. R. Musch – Dr. L. Lefèvre



Raadpleging na afspraak

Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 43 76

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 63 29

Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 20 62

	Dr. Musch	Dr. Lefevre
Maandag	/	Asse voormiddag
Dinsdag	Aalst voormiddag	Ninove voormiddag
Woensdag	/	Aalst voormiddag
Donderdag	Aalst voormiddag	Aalst namiddag
Vrijdag	Aalst avond	Aalst namiddag



Neus correctie

Plastische, esthetische en reconstructieve heelkunde

OLV Ziekenhuis

www.olvz.be



Algemeen

Een operatieve benadering ter correctie van de uitwendige vorm van de neus kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bult van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten.

Verder kan het ook mogelijk zijn om functionele klachten te verminderen, zoals verstopping of hoofdpijn. De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden. Het is belangrijk dat de patiënt zelf de operatie verlangt en dat dit niet wordt ingegeven door de omgeving.

Het resultaat van een neuscorrectie heeft een blijvend karakter. Over het algemeen worden bij neuscorrecties geen uitwendige huidsneden gemaakt. De littekens liggen doorgaans in de inwendige neusdelen en zijn dus niet waarneembaar. In een enkel geval is een snede noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot of langs de rand van de neusvleugels. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan plaatselijke verdoving of algemene narcose worden toegediend. Een ziekenhuisopname van enkele dagen kan noodzakelijk zijn.

Kleine correcties kunnen ambulante of in dagverpleging worden uitgevoerd.

Na de operatie valt de pijn over het algemeen erg mee. In de meeste gevallen zal de neus gedurende enkele dagen inwendig getamponneerd zijn, zodat de patiënt gedurende deze periode door de mond moet ademen. Er kan een forse zwelling na de operatie ontstaan ter plaatse van de gelaatshelft naast de neus, zoals bijvoorbeeld de oogleden. Deze zwelling duurt enkele dagen. Na de operatie zal meestal een gipsverband op de neus worden aangebracht, dat na 1 à 2 weken wordt verwijderd. De zwelling die na het verwijderen van dit gipsverband bestaat kan gedurende enkele maanden aanwezig blijven.

De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus, vooral de huid. De operatie biedt verbetering en meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen.

Zoals elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing of een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat, deze zijn echter uitzonderlijk.

In het bovenstaande hebben wij getracht u in te lichten over de operatie. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn en ook kan u geen garantie uit bovenstaande verkrijgen betreffende resultaten. Esthetische en plastische chirurgie is geen exacte wetenschap. Garantie op de resultaten of op een ongestoord operatief verloop kunnen wij u nimmer geven. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat.

