

## Voor en na



*Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan zal de plastisch chirurg deze graag tijdens het spreekuur met u doornemen. Ook de kosten van de operatie en een eventuele terugbetaling door de mutualiteit of verzekeraar zullen dan met u worden met besproken.*

## Voorstelling

### Plastisch chirurgen

Dr. R. Musch – Dr. L. Lefèvre



### Raadpleging na afspraak

*Campus Aalst*  
Moorselbaan 164  
9300 Aalst  
T. 053 72 43 76

*Campus Asse*  
Bloklaan 5  
1730 Asse  
T. 02 300 63 29

*Campus Ninove*  
Biezenstraat 2  
9400 Ninove  
T. 054 31 20 62

	Dr. Musch	Dr. Lefevre
Maandag	/	Asse voormiddag
Dinsdag	Aalst voormiddag	Ninove voormiddag
Woensdag	/	Aalst voormiddag
Donderdag	Aalst voormiddag	Aalst namiddag
Vrijdag	Aalst avond	Aalst namiddag



## Correctie onderste oogleden

Plastische-, esthetische- en  
reconstructieve heelkunde

**OLV Ziekenhuis**

[www.olvz.be](http://www.olvz.be)



## Algemeen

Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Die wallen zijn het gevolg van het slapper worden van de huid en de spieren rondom het oog en/of van vetophoping onder het oog. Ooglidwallen kunnen gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Met een medische term noemt men deze operatie blepharoplastie. Vaak wordt een onderste ooglidcorrectie gecorrigeerd met een correctie van de bovenste oogleden.

## Werkwijze

Correctie van de onderste oogleden kan zowel onder plaatselijke als onder volledige verdoving plaatsvinden via daghospitalisatie. Bij de operatie wordt een snede gemaakt onder de wimpers van de onderste oogleden met een voorbereiding naar de buitenste ooghoek. Daarna wordt het overtollige vetweefsel verwijderd en het huidoverschot weggehaald. De huid wordt naar de zijkant strak getrokken en gehecht. De littekens vervagen na verloop van tijd en zijn dan vrijwel onopvallend.

Na een correctie van de onderste oogleden zijn deze blauw en gezwollen. Het verdient aanbeveling om thuis de oogleden de eerste dagen te koelen met vochtige kompressen. Het is ook verstandig om geen zware lichamelijke inspanningen te verrichten.

De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Een pijnstiller is meestal niet nodig. Na ongeveer een week worden de hechtingen verwijderd.

## Is een ooglidcorrectie een risicovolle behandeling?

Een enkele keer komt er een meer dan normale bloedlekkage voor. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien. Ook kunt u last krijgen van een trekkend litteken of wat vochtophoping rond de ogen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten echter vanzelf. Vanaf de 2de week na de operatie kunnen de verkleuringen rond de ogen worden gecamoufléerd met een crème.

