



OLV Ziekenhuis

**GYNAECOLOGIE -
VERLOSKUNDE**

Dr. Van Den Haute J.
Dr. Meganck G.
Dr. Vandeginste S.
Dr. Seynhave B.
Dr. Traen K.

T. 053 72 49 50
F. 053 72 45 47

Secretariaat.gynaeco@olvz-
aalst.be

Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 41 11
F. 053 72 45 86

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11
F. 02 300 63 00

Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 21 11
F. 054 31 21 21

Informatiefolder voor de patiënte

Colposcopie

Inleiding

Bij dit onderzoek voor vrouwen kijkt de gynaecoloog via een aangepaste microscoop of de baarmoederhals afwijkingen vertoont. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van een uitstrijkje waarvan de uitslag duidt op een mogelijke afwijking.

Het onderzoek

U ligt op de gynaecologische onderzoekstafel, in gynaecologische onderzoekspositie. De gynaecoloog plaatst het speculum in de vagina om deze open te houden en de baarmoederhals in het zicht te brengen. Daarna plaatst de gynaecoloog de colposcoop voor de vagina en kijkt hij via het speculum door de colposcoop naar de baarmoederhals, die op die manier vele malen vergroot te zien is.

Om afwijkingen duidelijk te kunnen onderscheiden van gezond weefsel wordt de oppervlakte van de baarmoedermond aangestipt met een azijnzuuroplossing en/of een kleurvloeistof. Dit is volledig pijnloos.

Tijdens de colposcopie neemt de gynaecoloog eventueel weefsel af (biopsie) uit het verdachte gebied, voor weefselonderzoek in het laboratorium. Dit gebeurt zonder verdoving, maar is pijnloos.

Nazorg

Er is geen specifieke nazorg noodzakelijk. Wat bloederige afscheiding vaginaal is normaal na een biopsie. Seksueel contact, wordt in geval van biopsienamen afgeraden gedurende 2 weken.

Wanneer contact opnemen met de arts?

- Als bloedverlies heviger wordt (meer dan uw normale menstruatie)
- Als u koorts krijgt

Het resultaat

Als bij de colposcopie niets afwijkends is te zien, zal de arts u dat meteen vertellen. Als er biopten zijn genomen, duurt het meestal één week voordat het pathologisch laboratorium de uitslag daarvan heeft. Uw arts zal U meestal vragen hierover na één week telefonisch contact op te nemen.