

# Richtlijnen na hersteloperatie niet-ingedaalde teelbal en hydrocele

## Informatiebrochure



## Beste ouders, begeleiders

Deze folder bevat algemene informatie, bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de behandelende arts.

- **Voeding:** Geef uw kind lichtverteerbare voeding op de dag van de operatie. Ten gevolge van de narcose kunnen de maag en darmen een beetje vervelend gaan doen.
- **Pijn en koorts:** Matige koorts tot 38 °C is normaal. Als uw kind klaagt van pijn of onrustig is, kan u steeds een pijnstillend middel geven. Vb. Perdolan<sup>®</sup> of Nurofen<sup>®</sup>.
- **Zwelling:** T.h.v. de operatiewonden kan een lichte zwelling ontstaan. Dit is normaal en verdwijnt na enkele dagen.
- **Bloeduitstorting:** De balzak kan na de operatie blauw verkleurd zijn. Dit verdwijnt spontaan na enkele dagen.
- **Verband:** Ter hoogte van de operatie-wonden bevindt zich een waterafstotend verband. Dit verband mag, indien weinig bevuild en goed gesloten, ter plaatse blijven tot wanneer u op controle komt bij de arts. Met dit verband mag uw kind douchen of snel baden.
- **Bij vermoeden van wondinfectie (roodheid, zwelling en pijn) is het noodzakelijk een arts te raadplegen.**

- **Rust:** Het is aangeraden om uw kind de eerste dagen bezig te houden met rustige activiteiten. Meestal is hij nog wat moe en/of prikkelbaar ten gevolge van de narcose.  
Uw kind wacht beter 2 à 3 weken met het hervatten van sportbeoefening en zwemmen.
- **School:** Uw kind kan meestal naar school na een paar dagen.
- **Attesten:** Voor een schoolattest, een attest voor sociaal verlof en documenten van de hospitalisatieverzekering kan u zich wenden tot het secretariaat urologie of de uroloog zelf.

Heeft u thuis nog vragen of een probleem, dan mag u ons contacteren.

### **Kinderafdeling**

T. 02 300 63 01

### **Dr. Van Thillo**

Secretariaat urologie: T. 02 300 63 25





**OLV Ziekenhuis  
Kinderafdeling**

Campus Asse

Bloklaan 5

1730 Asse

**Contact**

T. 02 300 63 01