

Patiëntenvoorlichting

Verwijdering van wijsheidstanden

Toepassingsgebied: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove - Mond-, Kaak-, en Aangezichtsheelkunde

Wijsheidstanden hebben zelden een functie en geven vaak aanleiding tot klachten. Daarom moeten ze meestal verwijderd worden. Het is zelden zo dat deze kiezen normaal in de rij staan en helpen bij het kauwen. Meestal is er ruimtegebrek waardoor reiniging niet goed mogelijk is. Hierdoor ontstaat een sluimerende, chronische ontsteking.

Als de chronische, pijnloze ontsteking overgaat in de acute vorm, ontstaat pijn en zwelling van de wang. Doordat de mond niet open kan, wordt het moeilijk om de wijsheidstand te verwijderen. Uitbreiding van de ontsteking naar de diepte kan de mens zo ziek maken, dat opname in het ziekenhuis met een behandeling onder narcose nodig wordt.



Wanneer moet de wijsheidstand verwijderd worden?

Verwijdering van de wijsheidstanden vindt bij voorkeur tussen het 15e en 25e levensjaar plaats. Het ontstaan van klachten wordt dan voorkomen en er heeft nog geen aantasting van het tandvlees of de kiezen plaatsgevonden. Bovendien is verwijdering op jonge leeftijd eenvoudiger en verloopt de genezing beter. Wachten tot er klachten zijn heeft als gevolg dat er schade is aangericht en de behandeling moeizamer verloopt. Meestal beginnen de klachten ook nog op een ongelegen moment. Dus, anders dan wel eens gedacht wordt, is verwijdering van de wijsheidstand noodzakelijk, ook als men geen klachten heeft. Echter, er zijn uitzonderingen: dit zijn de mensen waarbij de wijsheidstand een bijdrage levert in de kauwfunctie. Deze wijsheidstanden nemen hun plaats in ter hoogte van de tandenrij zoals de andere tanden.

De behandeling

De behandeling gebeurt onder lokale verdoving, kant per kant of in één operatie onder algemene verdoving.

Complicaties

Stoornis van het gevoel in de halve kin en onderlip kan optreden na de verwijdering van een wijsheidstand uit de onderkaak, doordat de wortels van de kies tegen de verzorgende zenuw aan kunnen liggen. Gelukkig komt het gevoel meestal terug al kan dit weken duren.

Campus Aalst
Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 41 11
F. 053 72 45 86

Campus Asse
Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11
F. 02 300 63 00

Campus Ninove
Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 21 11
F. 054 31 21 21



Hinderlijker is het als het gevoel in de halve tong uitvalt. Dit komt doordat de zenuw bij de verdoving is aangeprikt of doordat het weefsel dat bij de verwijdering van de wijsheidstand opzij is gehouden opgerekt of beschadigd is. Herstel treedt meestal spontaan op en de complicatie is zeldzaam.

Bij verwijdering van een wijsheidstand uit de bovenkaak is het niet altijd te vermijden dat de sinus open gaat. Deze opening moet worden gesloten om ontsteking van de kaakholte te voorkomen.

Het vrijleggen van geretineerde elementen.

Geretineerde of geïmpacteerde gebitselementen zijn tanden en kiezen die niet op de normale tijd doorbreken, zoals b.v. de hoektand die normaal tussen het 10e en 13e jaar zijn plaats in het blijvende gebit inneemt.

Mogelijke oorzaken zijn:

- erfelijkheid
- te weinig ruimte
- trauma
- cysten/gezwellen

De kaakchirurg kan dan op een aantal manieren het element in de mond zichtbaar maken.