

Indien u toch een probleem vermoedt, dan verzoeken we u zo snel mogelijk met ons contact te nemen. Buiten de kantooruren biedt u zich aan op de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis. We worden dan verwittigd van uw komst en komen naar u kijken zo nodig.

Asymmetrie is in de beginperiode mogelijk. Blijken deze nog na een 3-tal maanden aanwezig te zijn, dan zal met u besproken worden of dit chirurgisch kan worden gecorrigeerd, op voorwaarde dat uw gewicht stabiel is gebleven tijdens deze periode.

Ook hier geldt: bij twijfel steeds contact met ons opnemen. We benadrukken dat bovengenoemde zaken eerder uitzonderlijk zijn en in de meerderheid van de gevallen deze ingreep relatief eenvoudig is, met een vlug herstel tot gevolg.

Bij vragen of opmerkingen staan wij ter beschikking voor u tijdens onze spreekuren.

Deze brochure heeft niet de intentie noch de consultatie, noch het onderzoek, noch de indicatiestelling, noch de opvolging en het persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als leidraad voor de ingreep waar u interesse in vertoont.



Dr. Lucien Lefèvre

Dr. Dries Opsomer

Dr. Gregory Van Eeckhout



info@plast-chirurgie.be



www.plast-chirurgie.be



OLV Ziekenhuis +32(0)53 72 43 76



[plastischeheelkundeaalstasseninove](https://www.facebook.com/plastischeheelkundeaalstasseninove)



[@plastische_chirurgie_aalst](https://www.instagram.com/plastische_chirurgie_aalst)

OLV Campus Aalst

Moorselbaan 164 - Aalst

OLV Campus Asse

Bloklaan 5 - Asse

OLV Campus Ninove

Biezenstraat 2 - Ninove

Privé praktijk Aalst

Capucienenlaan 49 - Aalst

+32(0)53 71 02 22



Liposuctie



Plastische Heelkunde

Aalst - Asse - Ninove

Het probleem

Lokale vetophopingen, zelfs bij mensen met een verder normale lichaamsbouw, kunnen storend zijn. Liposuctie is een techniek waarbij vetcellen door smalle buisjes onder vacuüm worden weggezogen. Toch moet er duidelijk gesteld worden dat **liposuctie contourchirurgie is en niet de oplossing voor mensen met een probleem van overgewicht**. Deze abnormale vetophopingen kunnen gesitueerd zijn ter hoogte van de hals, borstregio, buik, love handles, rug, heupen (rijbroek), billen (banana rolls), knieën of benen. Bij liposuctie moet uw huid over voldoende elasticiteit beschikken om een huidoverschot achteraf te vermijden. Liposuctie biedt geen behandeling tegen cellulitis of sinaasappelhuid.

Vooraf

Op de consultatie zal samen met u gekeken worden of u in aanmerking komt voor deze ingreep. Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden, medicatie gebruik (bloedverdunners in het bijzonder), allergie alsook naar problemen met hoge bloeddruk en stollingsstoornissen. Vervolgens gaan we over tot het onderzoeken van de probleemzones. Uw verwachtingen worden gepeild en getoetst aan wat wij kunnen realiseren. Na grondig bespreken van eventuele onderzoeken en indicatiestelling kunnen wij uw ingreep inplannen. Ook zal u de nodige afspraken meekrijgen voor eventuele vooronderzoeken, alsook informatie over de lipopanty. Dit is een speciaal ontworpen elastisch aansluitend pak, dat ophoping van vocht na de ingreep wegduwt en "vorm" geeft aan uw lichaam.

De dag van de ingreep

Beperkte liposucties gebeuren soms ambuland onder plaatselijke verdoving, meer uitgebreide liposucties vergen een algemene verdoving. Dit wordt uiteraard vooraf besproken op de consultatie.

Bij ingrepen onder volledige verdoving is een dagopname vereist en dient u nuchter binnen te komen. Voor een ingreep onder plaatselijke verdoving niet. Samen wordt de ingreep nog eens overlopen en worden foto's genomen om voor en na te vergelijken. Met een stift markeren we referentiepunten en lokale vetopstapeling. In het operatiekwartier wordt u voorbereid op de ingreep. Zorg ervoor dat u de lipopanty meebrengt naar de operatiekamer, u zal ze onmiddellijk na de ingreep dragen.

Bij lokale anesthesie worden de te behandelen zones ontsmet en worden er steriele afdekdoeken geplaatst. Vervolgens zal de chirurg kleine insputingen rondom de voorziene prikgaatjes geven om de huid te verdoven. Dit wordt door de meeste patiënten ervaren als een gespannen en prikkelend gevoel dat na een paar seconden verdwijnt. Vervolgens zal de chirurg een vloeistof met verdovingsmiddel insputen via deze kleine gaatjes waar er vetopstapeling is. Na inwerken van het product wordt het teveel aan vet door middel van fijne buisjes weggezogen.

Bij algemene verdoving merkt u van bovenstaand niets omdat u slaapt. Na de ingreep wordt de huid gesloten met een hechtingsdraad waarover een steriel verband gaat dat een kleine week ter plaatste blijft. Vervolgens wordt hierover de lipopanty gedragen.

Na een korte observatie mag u huiswaarts gaan. U krijgt een voorschrift voor pijnstillers mee en een vervolgspraak.

Achteraf

Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt aangeraden de rest van de dag rustig door te brengen. Het is mogelijk dat tot de dag erop, uit de kleine gaatjes een rosé-achtige vloeistof loopt, wat normaal is. Bij helder rood bloed moet u ons steeds verwittigen.

De pijn houdt gemiddeld een viertal dagen aan en vermindert fel vanaf de vijfde dag na de

operatie. Neemt de pijn in ernstige mate toe, dan is het raadzaam om uw arts te contacteren.

U mag lichte activiteiten verrichten, maar sportactiviteiten dienen minstens een 3-tal weken te worden gestaakt. Indien waterdichte pleisters zijn aangebracht mag u een douche nemen, maar het uittrekken van de lipopanty moet tot een strikt minimum beperkt worden.

Na een week komt u terug op consultatie om de hechtingen te verwijderen. Na verwijdering kan het zijn dat bepaalde zones nog hard aanvoelen. Er zullen u geschikte zalven voorgesteld worden om het litteken te verzachten. Pas op met blootstelling aan de zon na deze ingreep. Gedurende 6 maanden wordt aangeraden de littekens te beschermen met een zonnebescherming factor 50+. Het eindresultaat mag u na en 3-tal maanden verwachten.

Verwikkelingen

Als er een goede indicatie is en de richtlijnen goed worden opgevolgd is de kans op verwikkelingen beperkt. De eerste dagen na de ingreep kan er sprake zijn van een uitgesproken "blauwe plekken" gevoel, eventueel gepaard met zwelling en blauw/paarsverkleuring van de huid en licht ongemak, met verminderde gevoeligheid van bepaalde zones van de huid waar de liposuctie heeft plaatsgevonden. Om vochttopstapeling en zwelling zoveel mogelijk te reduceren, is het strikt dragen van de lipopanty aangewezen. Na 4 tot 6 weken is deze zwelling normaal verdwenen. Deze zwelling kan in het begin de indruk van een niet-symmetrisch resultaat nabootsen, wat zal verdwijnen na het wegtrekken van deze zwelling. Daarnaast heeft u de klassieke complicaties die kunnen optreden na elke chirurgische ingreep zoals nabloeding en infectie. Ons team doet al het mogelijke om deze complicaties te vermijden, ook van u wordt verwacht u aan de aanbevelingen te houden.