



Dr. Lucien Lefèvre

Dr. Dries Opsomer

Dr. Gregory Van Eeckhout



info@plast-chirurgie.be



www.plast-chirurgie.be



OLV Ziekenhuis +32(0)53 72 43 76



[plastischeheelkundeaalstasseninove](https://www.facebook.com/plastischeheelkundeaalstasseninove)



[@plastische_chirurgie_aalst](https://www.instagram.com/plastische_chirurgie_aalst)

OLV Campus Aalst

Moorselbaan 164 - Aalst

OLV Campus Asse

Bloklaan 5 - Asse

OLV Campus Ninove

Biezenstraat 2 - Ninove

Privé praktijk Aalst

Capucienenlaan 49 - Aalst

+32(0)53 71 02 22



Oorcorrectie

Deze brochure heeft niet de intentie noch de consultatie, noch het onderzoek, noch de indicatiestelling, noch de opvolging en het persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als leidraad voor de ingreep waar u interesse in vertoont.



Plastische Heelkunde

Aalst - Asse - Ninove

Het probleem

Afstaande oren zijn een aangeboren probleem. Door een misvorming van het kraakbeen van het oor, staat het oor verder van de schedel af. Een correctie van dit probleem noemen we otoplastie. Bij kinderen wordt een oorcorrectie uitgevoerd vanaf de leeftijd van 5 à 6 jaar.

Vooraf

Op de consultatie zal samen met u gekeken worden of u in aanmerking komt voor deze ingreep. Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden, medicatie gebruik (bloedverdunners in het bijzonder), allergie alsook naar problemen met hoge bloeddruk en stollingsstoornissen. Vervolgens gaan we over tot het onderzoek van de oren.

De dag van de ingreep

De dag van de ingreep komt u binnen op het afgesproken uur. Een oorcorrectie wordt bij volwassenen onder lokale verdoving uitgevoerd, bij kinderen onder algemene verdoving. Bij ingrepen onder lokale verdoving hoeft u niet nuchter te zijn en komt u op het afgesproken moment naar het ziekenhuis. Als er sprake is van een algemene verdoving wordt u voor een dag gehospitaliseerd en mag u 's avonds naar huis.

Voor de ingreep moet u minstens zes uur nuchter zijn.

Aan patiënten met lange haren wordt gevraagd ze in een staart te dragen.

De ingreep duurt ongeveer 40 min tot 1,5 uur, afhankelijk van de operatieve techniek die moet toegepast worden.

De haren worden niet geschoren voor deze ingreep.

Het litteken bevindt zich steeds aan de achterzijde van het oor en is onopvallend.

Na de ingreep heeft u gedurende één week een verband rondom de oren en de schedel. U krijgt pijnstillers en eventueel antibiotica voorgeschreven.

Achteraf

Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt aangeraden het rustig aan te doen. Het is mogelijk dat de oren de eerste dagen gevoelig zijn. Na de ingreep moet u waakzaam zijn voor twee mogelijke complicaties. De eerste complicatie is een nabloeding. Deze doet zich meestal binnen de 24 uur na de ingreep voor. Pijn die niet vermindert door inname van pijnstillers of een doorbloed verband kunnen op een nabloeding wijzen. De tweede complicatie is een infectie, welke zich uitzonderlijk voordoet. Dit ontstaat meestal de tweede tot vijfde dag na de ingreep. Alles gaat dan prima na de ingreep, maar na een aantal dagen neemt de pijn fors toe. Deze pijn veroorzaakt een kloppend gevoel en vermindert niet met pijnstillers. Bij twijfel of wanneer bovenstaande zaken zich voordoen, neemt u best onmiddellijk contact met ons op. Buiten de kantooruren kan u terecht bij de Spoedgevallendienst van ons ziekenhuis.

Belangrijk is om het verband goed te laten zitten. Bij jeuk niet met de vingers tussen het verband gaan zitten. Het verband mag niet natgemaakt worden. Zo het verband toch is losgekomen of afgevallen, neemt u best met ons contact op.

Na een week komt u op consultatie terug om het verband eraf te halen. Het is normaal dat de oren er dan wat te plat uitzien. Meestal zijn ze ook wat roder van kleur.

De hechtingen zullen worden verwijderd. In de komende weken zal de huid van het oor de normale kleur aannemen en zal de positie van de oren natuurlijker worden.

Er wordt aangeraden om de eerste 3 à 4 weken te slapen met een haarband om het plooiën van het oor tijdens slapen te vermijden. Contactsporten zijn tijdens deze periode

verboden. Ook bij het drogen van de haren en het aantrekken van kledij moet men ervoor zorgen niet teveel op de oren te trekken. Dit kan ervoor zorgen dat de draadjes die het oor gepluimd houden, losschieten, met een afstaand oor tot gevolg. Na een viertal weken is het gevaar min of meer geweken door interne verlittekening.

Verwikkelingen

Als er een goede indicatie is en de richtlijnen goed worden opgevolgd, is de kans op complicaties beperkt.

Nabloeding en infectie werden reeds besproken in de paragraaf "Achteraf".

Zeer uitzonderlijk kan achter het oor een overdreven vorming van littekenweefsel ontstaan. Wanneer dit zich voordoet raden wij u aan zo snel mogelijk op consultatie te komen om een gepaste bijkomende behandeling te starten.

Bij vragen of opmerkingen staan wij ter beschikking voor u op onze spreekuren.