



Dr. Lucien Lefèvre

Dr. Dries Opsomer

Dr. Gregory Van Eeckhout



info@plast-chirurgie.be



www.plast-chirurgie.be



OLV Ziekenhuis +32(0)53 72 43 76



[plastischeheelkundeaalstasseninove](https://www.facebook.com/plastischeheelkundeaalstasseninove)



[@plastische_chirurgie_aalst](https://www.instagram.com/plastische_chirurgie_aalst)



Rimpelbehandeling door botulinum toxine

Deze brochure heeft niet de intentie noch de consultatie, noch het onderzoek, noch de indicatiestelling, noch de opvolging en het persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als leidraad voor de ingreep waar u interesse in vertoont.

OLV Campus Aalst

Moorselbaan 164 - Aalst

OLV Campus Asse

Bloklaan 5 - Asse

OLV Campus Ninove

Biezenstraat 2 - Ninove

Privé praktijk Aalst

Capucienenlaan 49 - Aalst

+32(0)53 71 02 22



Plastische Heelkunde

Aalst - Asse - Ninove

Het probleem

Door het bewegen van onze mimische spieren onderhuids in het gelaat trekken we rimpeltjes in de huid van het gelaat.

Als deze enkel bij spieractiviteit te zien zijn spreken we over dynamische rimpels. Rimpels die ook te zien zijn bij een gelaat "in rust" zijn statische rimpels. Deze rimpels zijn meestal groter en dieper en langer bestaand dan de dynamische rimpels en vragen dus mogelijk een iets intensievere behandeling.

Door de activiteit in de onderhuidse mimische spieren te blokkeren met botulinum toxine, kan de spier ook geen rimpel meer veroorzaken in de huid waardoor deze zich ontspant. Daardoor ontstaan er geen dynamische rimpels meer, die later persisterend kunnen worden als statische rimpels.

Botulinum toxine is een volstrekt veilig product als er deskundig wordt mee omgesprongen.

Vooraf

Op de consultatie zal samen met u gekeken worden of u in aanmerking komt voor deze behandeling.

Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden, medicatie gebruik (bloedverdunners in het bijzonder), allergie alsook naar problemen met hoge bloeddruk en stollingsstoornissen.

Vervolgens gaan we over tot het analyseren van de rimpels in uw gelaat. Botulinum toxine werkt het meest efficiënt op de denkrimpels tussen de wenkbrauwen, de fronsrimpels van het voorhoofd en de kraaienpootjes aan de zijkant van de ogen. Afhankelijk van de activiteit in deze spieren en de hoeveelheid gebruikt product zal de activiteit van deze spieren stoppen. Hierdoor ontspant de huid zich en vervagen rimpels. De spiertjes vinden echter een uitweg om deze blokkage teniet te doen, waardoor u na een paar maanden weer zal kunnen bewegen, met rimpelvorming tot g e v o l g .

De normale werkingsduur van botulinum toxine bedraagt 3 tot 4 maand, afhankelijk van de activiteit in deze spieren. Als u bijvoorbeeld zeer expressief bent, zet u deze spieren hard aan het werk en kan het product sneller uitgewerkt zijn. Dit kan opgelost worden door bij een volgende behandeling de dosis op te drijven. U zal merken -wanneer u niet de gelegenheid laat aan de spier om te recupereren- dat het interval tussen twee behandelingen groter zal worden.

De behandeling

De behandeling gebeurt tijdens een consultatie. De chirurg bespreekt met u welke rimpels storend zijn en kan de prikplaatsen aanduiden met een markeerpotlood.

Afhankelijk van uw wens kunnen rimpels "zacht" behandeld worden, waarbij u toch nog een zekere expressie in uw gelaat behoudt. Er kunnen foto's genomen worden om de rimpels in de toekomst op te volgen.

Vervolgens wordt uw gelaat ontsmet. De chirurg bereidt het product uit de flacon en trekt dit op in een spuit met een zeer fijne naald. Vervolgens krijgt u een prikje op de vooraf aangeduide plaatsen. Het prikken is licht storend, maar zeer aanvaardbaar.

Onmiddellijk na de inspuitingen mag u naar huis toe. Er kan een koude compres op de behandelde zones geplaatst worden.

Achteraf

De werking van het product laat zich na een 4-tal dagen merken. U zal zien dat het moeilijker wordt om bepaalde spierbewegingen uit te voeren. Dit effect neemt toe tot drie weken na de injectie en houdt een 3-tal maand aan. Daarom is het belangrijk om de tweede behandeling in het begin niet langer dan drie tot vier maanden uit te stellen, zo niet zal de rimpel onverbiddelijk opnieuw verschijnen.

Verwikkelingen

Als er een goede indicatie is en de richtlijnen goed worden opgevolgd is de kans op verwikkelingen beperkt.

Heel zelden leidt het prikken tot de vorming van een discrete "blauwe plek", welke geen invloed heeft op de werking en makkelijk kan weggewerkt worden met camouflage producten indien gewenst.

Door de precieze injectie met wel gekende dosissen van het product hoeft u niet bang te zijn voor algemene bijwerkingen. Het kan voorkomen dat een spier minder of meer dan verwacht reageert op het botulinum toxine. In dit geval zal bij volgende behandelingen kleine wijzigingen in de dosis aangebracht worden.

De behandeling wordt afgeraden bij patiënten gekend met de aandoening myasthenia gravis.

Bij vragen of opmerkingen staan we ter beschikking voor u tijdens onze spreekuren.