

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist Bevacizumab (Avastin®) te geven.

Bevacizumab is een antilichaam dat gericht is tegen een specifieke groeifactor (VEGF). Het blokkeert de groei van bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof naar de tumorcellen brengen. Op die manier kan Bevacizumab de groei van de tumor remmen.

Bevacizumab wordt in combinatie met chemotherapie (Taxol® of een combinatie van Carboplatinum® en Taxol®) gebruikt.

Deze therapie wordt gegeven om de ziekte te verbeteren of minstens te stabiliseren.

Verloop van de therapie

Toedieningen van Bevacizumab gebeuren intraveneus twee- of driewekelijks via het oncologisch dagziekenhuis.

De eerste toediening verloopt over 90 min, de tweede over 60 min. Vanaf de derde cyclus worden de toedieningen over 30 min gegeven.

De verpleegkundige zal voor de start van elke toediening een bloedstaal afnemen. De behandelend arts zal informeren naar eventuele neveneffecten.

Bij onvoldoende recuperatie van de bloedcellen of ernstige neveneffecten kan door de arts worden beslist om de therapie met één week uit te stellen.

Na twee à drie maanden therapie zal een CT- grafisch nazicht gebeuren.

Bij gunstige evolutie en goede tolerantie wordt de therapie, Bevacizumab in combinatie met chemotherapie, verdergezet.

Na vier à zes maanden therapie volgt een eindevaluatie. Bij gunstig resultaat wordt chemotherapie gestaakt en Bevacizumab in monotherapie verdergezet.

Plaats van toediening

De toedieningen van gebeuren tweewekelijks via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op T6 of D6, 6de verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost op de afdeling T6 of D6.

Meer praktische informatie kan u terugvinden in de informatiebrochure die u krijgt bij het secretariaat Radiotherapie-Oncologie.

Nevenwerkingen van de therapie

Frequente nevenwerkingen

- Verhoogde bloeddruk
- Eiwitverlies in de urine

Minder frequente nevenwerkingen

- Hartproblemen: pijn op de borst
- Wondhelingsproblemen
- Bloedingen
- Bloedklontervorming: trombose- embolie

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Allergische reactie
- Darmperforatie

Specifieke richtlijnen

Door Bevacizumab kunt u last hebben van een verhoogde bloeddruk. Daarom zal uw bloeddruk gecontroleerd worden voor en na de toediening van Bevacizumab.

Omdat Bevacizumab een normale wondgenezing kan verstoren, is het belangrijk dat u eventuele heelkundige ingrepen (bijvoorbeeld aan de tanden) eerst met uw arts bespreekt.

Door Bevacizumab kan het eiwitgehalte in de urine verhoogd zijn. Daarom zal uw urine regelmatig gecontroleerd worden.

Indien u koorts (twee keer na elkaar $>38^{\circ}\text{C}$) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u zich aan te melden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.

Contactgegevens

Borstkliniek

Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Secretariaat Radiotherapie – Oncologie

Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist

Tel: 053 72 49 66

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 15/11/2023

Goedgekeurd door dr. Huygh