



OLV Ziekenhuis

**MULTIDISCIPLINAIR
PIJNTEAM**

T. 053 728900
F. 053 724134
mpt@olvz-aalst.be

www.olvz-aalst.be/mpt

Intercostaalblokkade

Indicatie

1. Diagnostisch blokkade Een intercostaal blokkade kan bedoeld zijn als een vorm van onderzoek waarbij een zenuw verlopend onder een rib (een intercostaal zenuw) met een naald wordt verdoofd. Hierbij kan men de pijnlijke zone in de borstkas precies localiseren. De blokkade is dan te beschouwen als een proefblokkade, waarbij men nagaat of het zinvol is om een bepaalde intercostaal zenuw definitief te verdoven (cfr. infoblad: "rhizotomie"). De zenuwblokkade wordt onder röntgendoorlichting of echografie uitgevoerd. Vaak is meer dan één intercostaal blokkade nodig om de pijn in kaart te brengen. Er wordt meestal slechts één intercostaal zenuw per dag op proef verdoofd. De plaatselijke verdovingsvloeistof is meestal vrij snel uitgewerkt.

2. Therapeutische blokkade In het andere geval is de intercostaal blokkade therapeutisch bedoeld, om de pijn voor langere tijd weg te nemen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de pijn zich over een groot deel van de borstkas uitstrekt. Meestal worden er dan meerdere intercostaalblokkades per zitting uitgevoerd.

Complicaties

Als mogelijke complicatie kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong kan optreden. De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Desalniettemin bestaat er een niet verwaarloosbare kans op deze complicatie. De behandeling van een klaplong bestaat er soms in dat onder plaatselijke verdoving een drainagebuisje rond de long moet ingebracht worden, wat een hospitalisatie vereist. Dit flexibel buisje blijft dan minstens 24u ter plaatse.

Evaluatie

1. Bij de intercostaalblokkade die bedoeld is als proefblokkade, kan het resultaat na ongeveer 15 à 30 minuten beoordeeld worden. Aan de hand van dit resultaat wordt dan een verder plan opgesteld.
2. Wanneer men een reeks intercostaalblokkades gekregen heeft, moet deze behandeling meestal na een zeker tijdsinterval herhaald worden. Aanvullend zal het gebruik van een speciale zalf en van medicatie in de vorm van tabletten meestal ook aangewezen zijn.

Opgelet !

1. Indien U op de dag van de geplande blokkade geen pijn heeft, gelieve dan te verwittigen.
2. Meld steeds indien U in het verleden een allergische reactie op een medicament vertoond hebt.
3. Informeer ons tijdig indien U een bloedverdunnend medicament inneemt.
4. Informeer ons steeds indien er een kans bestaat dat U zwanger zou zijn.
5. Na deze behandeling mag U niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen.

Campus Aalst

Moorselbaan 164
9300 Aalst
T. 053 72 41 11

Campus Asse

Bloklaan 5
1730 Asse
T. 02 300 61 11

Campus Ninove

Biezenstraat 2
9400 Ninove
T. 054 31 21 11