


## Samenstelling van de therapie

Intraveneuze gammaglobulines (of IVIG) zijn antilichamen geïsoleerd uit het bloed van gezonde donoren die kunnen toegediend worden bij patiënten met verlaagde antilichaamspiegels. Dit kan een gevolg zijn van een onderliggende bloed of beenmergkanker (vb. chronische lymfatische leukemie, multipel myeloom) of veroorzaakt worden door een chemotherapie behandeling of stamceltransplantatie. IVIG worden in deze situatie toegediend om de kans op (bacteriële) infecties te verminderen.

IVIG worden ook toegediend bij bepaalde auto-immuun aandoeningen zoals immune thrombocytopenie (dit is een aandoening waarbij de bloedplaatjes door het eigen immuunsysteem worden afgebroken).



Figuur: Schematische voorstelling van een antilichaam.

# Verloop van de therapie

IVIG worden toegediend als een intraveneus infuus (toediening via een ader). In geval van verlaagde antilichaamspiegels wordt dit infuus om de 4 weken herhaald.

IVIG worden toegediend op het dagziekenhuis (C6). Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6. De behandeling vereist niet dat U in het ziekenhuis blijft slapen.

## Nevenwerkingen van de therapie

*Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).*

*Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.*

### Frequent

- Infuus- en overgevoelighedsreacties
  - Lage rugpijn
  - Kortademigheid
  - Rillingen
  - Koorts
  - Beklemmend gevoel
- Vermoeidheid, klik [hier](#)

### Zeldzaam

- Bloedklontervorming (thrombose)
- Hersenvliesontsteking
- Verminderde nierfunctie

# Specifieke richtlijnen

Tijdens toediening van IVIG kan een overgevoeligheidsreactie optreden. Dit is een soort van allergische reactie die vaak verband houdt met de snelheid waarmee het geneesmiddel wordt toegediend (de infuussnelheid). Meestal is dit mild en kunnen er lichte koorts, rillingen en rugpijn optreden. In ernstige (zeer zeldzame) gevallen kan er een beklemmend gevoel op de borst, lage bloeddruk en ademhalingsmoeilijkheden optreden. Indien U één van deze symptomen ervaart tijdens de inloop van IVIG, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundig. Sowieso zal gedurende de toediening regelmatig uw bloeddruk, temperatuur en pols worden gecontroleerd.

Tijdens de inloop van de behandeling dient U alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.

# Contactgegevens Dienst Hematologie

## Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier