

## Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist een behandeling met Sacituzumab Govitecan (Trodelvy®) toe te dienen. Dit betreft een antilichaam gericht tegen Trop-2, vaak aanwezig bij triple negatieve borsttumoren, verbonden met chemotherapie.

## Verloop van de therapie

Eén cyclus chemotherapie duurt drie weken. Toedieningen gebeuren telkens de eerste en tweede week van elke cyclus. Per 3 cycli zal een ziekte evaluatie gebeuren (meestal door middel van een CT-scan). De therapie wordt verdergezet zolang er een gunstige evolutie is en de tolerantie dit toelaat.

Naam product	Dag 1	Dag 8	Dag 15
Trodelvy	x	x	/

# Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op D6 of T6, 6de verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op D6 of T6.

De verpleegkundige zal voor de start van elke toediening een bloedstaal afnemen. De behandelende arts zal informeren naar eventuele neveneffecten. Bij onvoldoende recuperatie van de bloedcellen of ernstige neveneffecten kan door de arts beslist worden de therapie met één week uit te stellen of een lagere dosis toe te dienen.

# Nevenwerkingen van de therapie

## Frequente nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met risico op infecties of bloedarmoede
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Vermoeidheid
- Diarree
- Haarverlies

## Minder frequente nevenwerkingen

- Overgevoeligheidsreactie tijdens de toediening: om deze reden gebeurt eerste toediening traag over 3 uur, volgende toedieningen gebeuren over 90 min, telkens gevolgd door 30 min observatieperiode.

## Specifieke richtlijnen

Om misselijkheid en braken tot een minimum te beperken, krijgt u 30 min voor de chemotherapie voorbereidende medicatie. U krijgt ook medicatie mee naar huis om klachten van misselijkheid de daaropvolgende dagen te voorkomen of verlichten.

Zorg dat u Imodium® bij de hand heeft ikv mogelijkheid op diarree.

Indien u koorts (twee keer na elkaar  $>38^{\circ}\text{C}$ ) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u zich aan te melden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling!

# Contactgegevens

## Borstkliniek

Campus Aalst  
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

## Secretariaat Radiotherapie – Oncologie

Tel: 053 72 44 79

## Verpleegkundig specialist

Tel: 053 72 49 66

### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 15/11/2023

Goedgekeurd door dr. Huygh