


Samenstelling van de therapie

Ibrutinib is een oraal geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van chronische lymfatische leukemie (CLL), mantelcellymfoom of de ziekte van Waldenström. Het geneesmiddel remt een eiwit in de kwaadaardige cel, het Bruton tyrosine kinase (BTK). Hierdoor remt het de groei van de kankercel.



Figuur: Ibrutinib remt het Bruton Tyrosine Kinase (BTK) eiwit.

Verloop van de therapie

Ibrutinib wordt als harde capsules van 140 mg afgeleverd. Het aantal capsules dat je dagelijks moet innemen hangt af van het type kanker. De capsules dienen in één enkele inname ingenomen te worden.

Aandoening	Aantal capsules per dag
Chronische Lymfatische Leukemie	3
Ziekte van Waldenström	3
Mantelcellymfoom	4

Ibrutinib dient ingenomen te worden zonder op de capsules te kauwen met een groot glas water. Het maakt niet uit wanneer U ibrutinib inneemt, maar dit gebeurt best op hetzelfde moment van de dag. Het geneesmiddel mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Indien U vergeten bent ibrutinib in te nemen, mag U de gemiste dosis inhalen indien er minder dan 6 uur verstreken is. Indien er meer dan 6 uur verstreken zijn, slaat U de dosis over. Neem nooit een dubbele dosis de dag erna in. Indien U braakt na inname van ibrutinib dient U geen nieuwe capsules in te nemen.

Ibrutinib kan enkel afgeleverd worden door de ziekenhuisapotheek. U zal van uw behandelend hematoloog een voorschrift krijgen waarmee U zich naar de ziekenhuisapotheek kan wenden.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent

- Spierpijn en gewrichtspijn
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)
- Diarree, klik [hier](#)
- Verhoogd risico op bloedingen
- Ophouden van vocht

Zeldzaam

- Hartritmestoornissen en hartkloppingen
- Huidafwijkingen, klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

De werking van ibrutinib kan beïnvloed worden door de inname van bepaalde geneesmiddelen. Dit zijn o.a. geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van schimmelinfecties, hartritmestoornissen en bloedverunners. Meld steeds nieuwe medicatie aan je behandelend hematoloog.

Ook het drinken van (grote hoeveelheden) pompelmoes sap kan de werking van ibrutinib verstoren. Probeer dit tot een minimum te beperken. Andere vruchtensappen zijn perfect veilig.

Ook Sint-Janskruid (welke gebruikt wordt als plantaardig slaapmiddel) dient vermeden te worden.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier