Digestieve Oncologie

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

# Pembroluzimab

## Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist om immunotherapie met pembroluzimab (Keytruda®) te starten.

Pembroluzimab is een immunotherapie: een behandeling die werkt via het immuunsysteem of afweersysteem. De behandeling stimuleert het eigen afweersysteem. Daardoor gaan de eigen afweercellen de kankercellen bestrijden.

## Verloop van de therapie

Deze monotherapie wordt volledig via infuus gegeven. Eén kuur duurt drie weken, waarvan er enkel op dag één immunotherapie wordt gegeven. De toediening verloop steeds via dagopname.

olv Top in Zorg.

| Product | Dag | | Toedieningswijze |
|---|---|---|---|
| | 1 | 2-21 | |
| **Pembroluzimab** | X | / | Infuus over 30 min |

Voor elke nieuwe toediening zal telkens een bloedafname gebeuren. Het aantal kuren behandeling zal uw arts met u bespreken. Na gemiddeld 3 maanden gebeurt een herevaluatie door middel van een gericht bloedonderzoek en radiologische onderzoeken.

Dosisverhoging of –verlaging wordt niet aanbevolen. Uitstel of onderbreken van de behandeling kan nodig zijn, afhankelijk van de individuele tolerantie en veiligheid. De behandeling moet worden vervolgd zolang klinisch verbetering wordt waargenomen of totdat de behandeling door de patiënt niet meer wordt verdragen.

# Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren driewekelijks via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6$^{de}$ verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6.

# Nevenwerkingen van de therapie

Behandelen met pembroluzimab kan leiden tot ontstekingsreacties door toegenomen of bovenmatige activiteit van het immuunsysteem (immuungerelateerde bijwerkingen) en waarschijnlijk door het werkingsmechanisme.

Zowel tijdens de behandeling als na de behandeling (tot minstens 5 maanden na de laatste dosis) moet u nauwlettend gemonitord worden, omdat nevenwerkingen zowel tijdens of na de behandeling kunnen optreden. De aanpak van dergelijke ontstekingen houdt in dat de arts uw klachten ofwel symptomatisch, ofwel met corticosteroïden behandelt en eventueel het behandelingsplan aanpast in functie van de ernst van de nevenwerking. Organen die kunnen worden aangetast zijn de longen, het maagdarmstelsel, het zenuwstelsel, de lever, de nieren, het endocriene stelsel, de huid of het hart.

## Mogelijke nevenwerkingen

- Vermoeidheid
- Misselijkheid
- Diarree
- Hoesten
- Kortademigheid

## Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Allergische reacties

# Specifieke richtlijnen

Let zelf goed op eventueel aanwezige nevenwerkingen en meldt dit steeds onmiddellijk aan de behandelende arts. Probeer niet zelf de ongemakken te behandelen zonder een arts te raadplegen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of sociaal verpleegkundige/maatschappelijk assistente te contacteren.

Succes met de behandeling!

# Contactgegevens

**Digestieve oncologie**
Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 70 65
digestieve.oncologie@olvz-aalst.be

D i s c l a i m e r

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 20/02/2019
Goedgekeurd door dokter Koen Hendrickx