

**Kinder-
genees-
kunde**


INFORMATIEBROCHURE

Postoperatieve zorgen na een urologische operatie



o/v
Top in Zorg.

1. Volledige circumcissie



1.1. Operatie

Bij deze heelkundige ingreep wordt de voorhuid verwijderd, zodat deze niet langer de eikel bedekt.

1.2. Nazorg

Pijnstilling: Op zich geven deze ingrepen weinig pijn, eerder wat overgevoeligheid. Sowieso werd er tijdens de verdoving ook plaatselijk nog een extra verdovend middel toegediend. Meestal is dit na een vier- tot zestal uur uitgewerkt. Daarom is het raadzaam om de avond van de ingreep wat pijnstillende siroop toe te dienen.

Er is een **plastic verbandje**, tegadern, aangebracht rond de penis van je kind. Dit blijft ter plaatse tot het er vanzelf afvalt. Als het plastic verbandje lost, brengt u vanaf dan 2x per dag **Terra Cortril®** suspensie aan, dit gedurende 1 week. Voor de verzorging kan u de zalf verwijderen of afweken met een nat compres (water of NaCl0,9%). Indien het plastic verbandje na één week nog steeds ter plaatse is, kan dit in bad worden losgeweekt of via de huisarts worden verwijderd. De hechtingen zijn zelf resorbeerbaar.

Verder raden wij aan om de eerste twee weken geen bad te nemen of niet te zwemmen.

De eerste dagen kunnen de wondjes ter hoogte van de penis nog een beetje bloederig vocht afgeven.

Door de operatiewonde kan de penis gezwollen zijn, om dit te voorkomen kan de penis omhoog gekleefd worden gedurende de eerste dagen.

Een controleafspraak is voorzien een zestal weken na de operatie.

2. Ebbehoy

2.1. Operatie

Tijdens deze heekkundige ingreep wordt de sterk vernauwde voorhuid wijder gemaakt zodat de voorhuid naar achter kan geschoven worden. De voorhuid blijft dus volledig bewaard waardoor de penis bedekt kan blijven.

2.2. Nazorg

Pijnstilling: Op zich geven deze ingrepen weinig pijn, eerder wat overgevoeligheid. Sowieso werd er tijdens de verdoving ook plaatselijk nog een extra verdovend middel toegediend. Meestal is dit na een vier- tot zestal uur uitgewerkt. Daarom is het raadzaam om de avond van de ingreep wat pijnstillende siroop toe te dienen.

Verzorging: De penis ontsmetten in een badje met chloraminetabletjes. Doe in een potje met water 1 à 2 chloraminetabletjes en laat de penis hier even in weken. Schuif de voorhuid nu goed en volledig naar achter tot je de rand van de eikel ziet. Dit is belangrijk om verklevingen tegen te gaan. Aansluitend brengt u enkele druppels Terra Cortril® suspensie aan. Dit doet u 2 keer per dag.


Door de operatiewonde kan de penis gezwollen zijn, om dit te voorkomen kan de penis omhoog gekleefd worden gedurende de eerste dagen.

De eerste dagen kunnen de wondjes ter hoogte van de penis nog een beetje bloederig vocht afgeven.

Verder raden wij aan om de eerste twee weken geen bad te nemen of niet te zwemmen.

Een controleafspraak is voorzien een zestal weken na de operatie.

3. Inguinale orchidopexie



3.1. Operatie

Via een kleine liesincisie wordt de teelbal losgemaakt en vervolgens ter hoogte van de balzak, tevens via een kleine incisie aldaar, gefixeerd.

3.2. Nazorg

Pijnstilling: Tijdens de verdoving werd ook plaatselijk nog een extra verdovend middel toegediend. Meestal is dit na een vier- tot zestal uur uitgewerkt. Daarom is het raadzaam om de avond van de ingreep alsook de eerste dagen wat pijnstillende siroop toe te dienen. Belangrijk om te weten is dat ten gevolge van deze lokale verdoving een tijdelijke verzwakking van de beenspieren kan ontstaan, waardoor het kan lijken alsof uw kind door zijn benen zakt. Daarom raden wij aan om hem de eerste keer niet alleen te laten stappen.

Op zich hoeven de wondjes **weinig nazorg**. De wonde ter hoogte van de lies werd gesloten door middel van verteerbare hechtingen. Het wondje ter hoogte van de balzak werd eveneens gesloten met verteerbare hechtingen. Ook dit wondje hoeft geen verdere nazorg.

Koorts: Een minimale temperatuursverhoging is niet abnormaal. Indien uw kind meer dan 38°C koorts maakt, neem dan contact op met een arts.

In **bad** gaan **of zwemmen** wordt gedurende een tweetal weken afgeraden. Het nemen van een douche kan in aanwezigheid van een doucheverbandje reeds een 2-tal dagen na ingreep.

Een controleafspraak is voorzien een zestal weken na de operatie.

4. Dorsale en laterale knipjes



4.1. Operatie

De patiënt die hiervoor binnenkomt heeft een fimosis, dit wil zeggen dat de voorhuid vernauwd is. Tijdens een heelkundige ingreep wordt hiervoor een knipje (of meerdere) gemaakt in de voorhuidring. De voorhuid kan nu gemakkelijk naar achteren geschoven worden. De voorhuid blijft bewaard, zodat de eikel van de penis nog bedekt kan blijven.

4.2. Nazorg

Pijnstilling: Tijdens de verdoving werd ook plaatselijk nog een extra verdovend middel toegediend. Meestal is dit na een vier- tot zestal uur uitgewerkt. Daarom is het raadzaam om de avond van de ingreep alsook de eerste dagen wat pijnstillende siroop toe te dienen. Belangrijk om te weten is dat ten gevolge van deze lokale verdoving een tijdelijke verzwakking van de beenspieren kan ontstaan, waardoor het kan lijken alsof uw kind door zijn benen zakt. Daarom raden wij aan om hem de eerste keer niet alleen te laten stappen.

Verzorging: De penis nat maken met een nat compres (water of NaCl0,9%) 2x per dag. Schuif de voorhuid nu goed en volledig naar achter tot je de rand van de eikel ziet. Dit is belangrijk om verklevingen tegen te gaan. Aansluitend brengt u enkele druppels Terra Cortril® suspensie aan. Dit doet u 2 keer per dag.

Door de operatiewonde kan de penis gezwollen zijn, om dit te voorkomen kan de penis omhoog gekleefd worden gedurende de eerste dagen.

De eerste dagen kunnen de wondjes ter hoogte van de penis nog een beetje bloederig vocht afgeven.

Een controleafspraak is voorzien een zestal weken na de operatie.

5. Kleur mij





6. Contactgegevens



Campus Aalst

Moorselbaan 164 – 9300 Aalst

Hoe kan u ons contacteren?

- Voor het maken van afspraken voor consultatie tussen 8u30 en 16u30: secretariaat kindergeneeskunde: tel 052/72 41 55
- Voor eventuele informatie inzake de kinderafdeling: receptie kinderafdeling: tel 053/72 43 80
- Tel URO: 053/72 43 78

Campus Asse

Bloklaan 5 – 1730 Asse

Hoe kan u ons contacteren?

- Tel kinderafdeling: 02 300 63 01

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.



Noodsituatie na ontslag uit het ziekenhuis?

- Bel uw huisarts of huisarts van wacht
- Zo nodig bel 112

www.olvz.be/olivia