

Samenstelling van de therapie

Deze therapie bestaat uit één celremmend geneesmiddel (cytostaticum) cabazitaxel dat via een infuus wordt toegediend. Daarnaast kunnen er nog enkele andere geneesmiddelen voorgeschreven worden. Die dienen ter ondersteuning van de behandeling, bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beperken.

Verloop van de therapie

Het schema wordt toegediend in cycli. Eén cyclus duurt 21 dagen en de behandeling wordt op de eerste dag van elke cyclus toegediend.

Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequente nevenwerkingen

- Een verminderd aantal rode of witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Een verminderd aantal bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Tijdelijk haarverlies, klik [hier](#)
- Ongewone vermoeidheid, klik [hier](#)
- Diarree, klik [hier](#)

Minder frequente nevenwerkingen

- Smaak- en reukverandering, klik [hier](#)
- Ontsteking van het mondslimvlies, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Griepachtige verschijnselen, klik [hier](#)
- Tintelingen en een voos gevoel in vingertoppen en tenen, klik [hier](#)
- Invloed op de seksualiteit en vruchtbaarheid, klik [hier](#)
- Droge huid, klik [hier](#)

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Allergische reactie op de chemotherapie, klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

- Voor deze behandeling neemt u ondersteunende medicatie in zoals medrol of prednisolone. Deze medicatie zal de nevenwerkingen van cabazitaxel verminderen. De chemotherapie kan en mag enkel worden toegediend als u deze medicatie hebt ingenomen vóór de toediening, zoals voorgeschreven. Meld het aan uw arts of verpleegkundige als u de medicatie bent vergeten.
- Tijdens de inloop van de behandeling dient u alert te zijn op pijn of zwelling ter hoogte van de insteekplaats. Indien dit zich voordoet, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige voor controle van het infuus.
- Indien u koorts (dit is temperatuur boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend arts/ huisarts.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of verpleegkundige te contacteren.

Contactgegevens Dienst Oncologie

Urologische oncologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 78

Marleen.de.pauw@olvz-aalst.be

Brecht.van.vaerenbergh@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 20/02/2019

Goedgekeurd door dokter Peter Schatteman