

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist het EC schema toe te dienen. EC is een combinatietherapie van twee producten:

- Epirubicine (Epirubicine®)
- Cyclofosfamide (Endoxan®)

Deze chemotherapeutische kuur wordt gegeven om de ziekte te stabiliseren of te verbeteren.

Verloop van de therapie

Voorafgaand aan de chemotherapie zal u een hartonderzoek ondergaan om de werking van de hartspier te controleren.

De toedieningen gebeuren driewekelijks. Na drie cycli chemotherapie zal een eerste evaluatie gebeuren, meestal door middel van een CT-scan. Bij een gunstig resultaat zullen drie aanvullende cycli EC gegeven worden, tot een totaal van zes toedieningen.

Om veiligheid van de toediening te garanderen zal voorafgaand een poortkatheter worden geplaatst.

Voor de inloop van Epirubicine® zal u een waterijsje worden aangeboden. Koeling voorkomt ontsteking van de mond en van het mondslijmvlies.

Plaats van toediening

De toedieningen van de chemotherapie gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op T6 of D6, 6de verdiep in het oude gebouw. U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op D6 of T6.

Voor elke toediening wordt een bloedstaal afgenomen. Indien u deze prik als pijnlijk ervaart is er mogelijkheid tot het vooraf aanbrengen van een lokaal verdovende klever of crème. Spreek uw arts hier gerust over aan.

Uw behandelend arts zal informeren naar eventuele nevenwerkingen.

Bij onvoldoende recuperatie van de bloedcellen of ernstige neveneffecten kan door de arts beslist worden de therapie met één week uit te stellen of een lagere dosis toe te dienen. Tijdens de therapie kunnen steeds dosisaanpassingen of extra rustweken worden ingelast.

Meer praktische informatie kan u terugvinden in de informatiebrochure die u krijgt bij het secretariaat Radiotherapie-Oncologie.

Nevenwerkingen van de therapie

Frekwente nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Moeheid
- Haarverlies
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met risico op infecties of bloedarmoede
- Tijdelijke rode-oranje verkleuring van de urine
- Uitschakelen van de eierstokfunctie met uitblijven van de menstruatie

Minder frequente nevenwerkingen

- Ontsteking van het mondslijmvlies
- Irritatie en/of tranen van de ogen
- Droge huid en overgevoeligheid aan de zon

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Verminderde pompfunctie van het hart

Specifieke richtlijnen

Om misselijkheid en braken tot een minimum te beperken, krijgt u 60 min vóór de chemotherapie voorbereidende medicatie.

U krijgt ook medicatie mee naar huis om klachten van misselijkheid de daaropvolgende dagen te voorkomen of verlichten.

Indien u koorts (twee keer na elkaar $>38^{\circ}\text{C}$) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u zich aan te melden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.

Contactgegevens

Borstkliniek

Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Secretariaat Radiotherapie – Oncologie

Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist

Tel: 053 72 49 66

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 15/11/2023

Goedgekeurd door dr. Huygh