


Waarom deze ingreep?

Sterilisatie van de man (vasectomie) is een eenvoudige en veilige heelkundige ingreep die een man definitief onvruchtbaar maakt. Dit gebeurt door de zaadleiters ter hoogte van het scrotum te onderbreken. Hierbij worden beide zaadleiters doorgesneden en afgebonden.

De ingreep is in principe onherroepelijk.

Een vasectomie wordt enerzijds uitgevoerd bij gewenste, blijvende steriliteit en anderzijds omwille van medische redenen in geval van recidiverende ontstekingen van de bijbal op basis van chronische prostatitis.


Een sterilisatie heeft GEEN invloed op uw seksleven. U kunt geen kinderen meer verwekken, maar u krijgt net als voorheen een erectie en een orgasme met ejaculatie (zaadlozing). Bij de zaadlozing bevat het sperma geen zaadcellen.



Vorbereiding

- Het uur van opname wordt u op de raadpleging meegedeeld.
- Indien de ingreep gebeurt onder algemene narcose dient u nuchter te zijn vanaf middernacht.
- Ontharen van het scrotum gebeurt op de afdeling.

Ingreep



- Onder plaatselijke of algemene narcose wordt een klein sneetje gemaakt (ongeveer 1,5 cm) ter hoogte van het scrotum.
- De zaadleider wordt gegrepen en doorgeknipt (1). De uiteinden worden dicht gebrand en onderbonden (2). Hierdoor kunnen zaadcellen uit de testikels niet meer bij de zaadvloeistof komen.
- De ingreep duurt ongeveer 30 minuten.

Risico's en mogelijke alternatieven

Een uitgebreide bloeduitstorting en/of zwelling is mogelijk tot enkele dagen postoperatief.

Contacteer uw arts in geval van:

- Nabloeding
- Ernstige zwelling
- Roodheid
- Indien u 1-2 weken pijn heeft in operatieve zone kan men vermoeden dat er een spermagranuloom aan de oorzaak ligt. Dit is een inflammatoire reactie op een spermalek, soms is het mogelijk dat er een infectie ontstaat.

Mogelijke alternatieven: uw vrouw zorgt voor de anticonceptie.

Resultaat en kans op succes

De zaadcellen die boven de onderbreking klaar zitten moeten nog geëjaculeerd worden alvorens u onvruchtbaar bent. Twee tot drie maanden na de ingreep wordt via een onderzoek van het zaadvocht gekeken of het geen zaadcellen meer bevat.

Soms is de wachttijd niet voldoende en moet het onderzoek na 4 tot 6 weken worden herhaald. Pas als er geen zaadcellen meer in het zaadvocht aanwezig zijn, bent u onvruchtbaar. In die tussenperiode is gebruik van een ander voorbehoedsmiddel noodzakelijk.

Een vasectomie is een betrouwbare anticonceptiemethode. Het risico dat de eindjes toch terug aan elkaar groeien is uitermate klein.

Nazorg

- U dient het 2-3 dagen rustig aan te doen. Het scrotum kan oncomfortabel voelen en soms is pijnmedicatie nodig.
- Draag enkele dagen een goed aansluitende en ondersteunende onderbroek.
- Zwem niet gedurende 2-3 dagen.
- Douchen is toegestaan, een zitbad niet.
- Hef geen zware gewichten, sport niet te hard gedurende 7 dagen.
- Na het binnenbrengen van een zaadstaal (3-tal maand na de ingreep) dient u de arts te contacteren voor het resultaat. Als er geen zaadcellen meer aanwezig zijn mogen andere voorbehoedsmiddelen worden gestaakt.

Contactgegevens

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 49 50

Fax: 053 72 45 47

Gynaeco-Verloskunde.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 62 96

Gynaeco-Verloskunde.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 86

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 28/08/2018

Goedgekeurd door dokter Bruno Seynhave