

Waarom dit onderzoek?

Een bronchoscopie is een onderzoek van de binnenzijde van de luchtwegen (bronchi) en gebeurt met een bronchoscoop. Dit is een soepel slangetje waarbij door middel van een lens en een lichtbron de luchtwegen worden onderzocht.

Vorbereiding

- Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Voor een onderzoek in de voormiddag mag u de avond voordien vanaf 24.00 uur niet meer eten of drinken. Als het onderzoek in de namiddag is geboekt, mag u een klein ontbijt nemen. Nadien mag u niets meer eten of drinken.
- Medicijnen mag u wel innemen met wat water. Ingeademde medicijnen zoals puffs (zoals Duovent[®], Seretide[®], Symbicort[®], Inuvair[®], ...) mag u zeker gebruiken.
- U mag 24 uur voor het onderzoek absoluut niet meer roken.
- Zeg het aan uw longarts indien u allergisch bent voor geneesmiddelen of verdovingsmiddelen.
- Zeg het ook indien u zwanger bent.
- Als u bloedverduunners neemt (zoals Marevan[®] – Marcoumar[®] – Sintrom[®] – Plavix[®] – Xarelto[®] – Pradaxa[®] – Lixiana[®] – Eliquis[®]), dient u deze minstens enkele dagen voor het onderzoek te stoppen, en dit steeds in overleg met uw arts.

- Ook bloedverdunnende spuitjes mag u de avond voor, of de dag van het onderzoek niet gebruiken. Deze medicijnen verhogen namelijk het bloedingsrisico (in het geval stukjes weefsel moeten worden genomen voor onderzoek).
- Als u Aspirine® of Asaflow® neemt moet u dit ook aan de arts vertellen, u hoeft deze medicatie echter niet te stoppen.
- Wanneer dit onderzoek ambulant (niet gehospitaliseerd) gebeurt, vergeet dan niet uw foto's van de longen mee te brengen indien deze niet in het OLV Ziekenhuis zijn genomen.

Waar moet u zijn?

Indien u niet bent gehospitaliseerd, dient u zich op de afgesproken datum te melden aan de inschrijfbalie in de inkomhal. U geeft er aan dat u voor een endoscopie van de longen komt.

Campus Aalst


U gaat met de lift naar de 3de verdieping 'Endoscopie X3'. Boven gekomen gaat u naar rechts (plafondbord 'Endoscopie X3'). Op einde van de gang gaat u terug rechts de dubbele deur door, u opent de deur met de drukknop. Aan uw rechter zijde vindt u dan de wachtzaal 'Endoscopie Longziekten'. Daar kan u plaatsnemen. De endoscopieverpleegkundige zal u ophalen en naar de onderzoekskamer brengen.

Campus Asse

U gaat naar het onthaal van de polikliniek longziekten (niveau -1 secretariaat longziekten), waar u zich meldt en waar u even kan wachten. Als u aan de beurt bent zal u naar de onderzoekskamer kunnen gaan.

Onderzoek

BRONCHOSCOPY



- De arts en/of verpleegkundige leggen u het onderzoek uit en beantwoorden uw vragen.
- Als u een gebitsprothese heeft, moet u deze voor het onderzoek uitdoen.
- U wordt in een stoel gezet of u ligt op een onderzoekstafel.
- De verpleegkundige verdooft uw keel en zo nodig de neusgaten enkele malen met een verdovingspray. Deze heeft soms een bittere smaak en geeft een gevoelloze keel. Tijdens de verdoving en het onderzoek kan u gewoon ademen maar niet spreken.

- Van zodra de verdoving is ingetreden, brengt de arts het instrument via de mond of de neus naar binnen. Als het kijkklampje (bronchoscoop) via de mond wordt ingebracht, krijgt u ook een bijtring ter bescherming van het toestel.
- Uitzonderlijk wordt de bronchoscopie onder narcose uitgevoerd.
- De luchtwegen worden stap per stap verdoofd, dus in het begin kan u wat hoesten hierbij.
- Tijdens het onderzoek kunnen er slijmen worden weggezogen welke naar het laboratorium gaan voor onderzoek.
- Het nemen van een biopt (stukje weefsel) is pijnloos maar er kan een kortdurend kriebelig gevoel ontstaan.
- Het onderzoek duurt gemiddeld 15 minuten.

Risico's

- Een bronchoscopie is een veilig onderzoek, maar kan een enkele keer complicaties geven.
- Het kan zijn dat u een tijdje een geïrriteerd gevoel in uw keel hebt en wat moeilijk slikt. Dat gaat vanzelf voorbij.
- Na het onderzoek kan u wat bloederig slijm ophoesten. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken, het dient wel te verdwijnen binnen de 2 dagen.
- Soms is er de avond van het onderzoek wat koorts. U mag hiervoor paracetamol (Dafalgan®, Perdolan®,...) nemen. Als het de volgende dag nog niet over is, neem dan contact op met uw huisarts of longarts.

- U wordt sowieso na de procedure even geobserveerd in het (dag)ziekenhuis.
- In het zeer zeldzame geval van aanhoudende pijn, kortademigheid of bloed ophoesten na het onderzoek, moet u ons bellen.

Resultaat

De arts die het onderzoek heeft uitgevoerd, vertelt u meteen na afloop een eerste resultaat. Als er bij u een stukje weefsel is weggenomen voor verder onderzoek in het laboratorium, krijgt u de uitslag daarvan bij de volgende raadpleging.

De facturatie gebeurt conform de wettelijke bepalingen gedefinieerd in het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen (welke jaarlijks worden gepubliceerd).

Nazorg

Indien de bronchoscopie onder narcose werd uitgevoerd, dan zal dat door de arts duidelijk worden gezegd. Dat betekent wel dat u:

- De eerste 24u niet alleen niet alleen mag zijn.
- Geen voertuig/wagen mag besturen.
- Onder begeleiding van een volwassene naar huis moet worden gebracht.

Het is belangrijk dat u tot 2 uur na het onderzoek niet eet of drinkt omdat u zich anders kan verslikken.

Contactgegevens Dienst Pneumologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 42 89

Fax: 053 72 41 50

Pneumologie.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 63 36

Fax: 02 300 63 35

Pneumologie.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2, 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 27

Fax: 054 31 20 64

Pneumologie.Ninove@olvz-aalst.be

In geval van nood buiten de kantooruren kan u contact opnemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis

- Aalst: 053-72.41.11
- Asse: 02-300.61.11

en dan vraagt u naar de dienstdoende longarts.

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 07/11/2018
Goedgekeurd door dokter Evert
Munghen

