Hoofd- en Hals-Oncologie

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

TPF schema

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist een combinatie van Docetaxel (Taxotere®), Cisplatine (Cisplatinum®) en Fluorouracil (5FU®) toe te dienen. Deze therapie wordt gegeven in de hoop hiermee de tumor te kunnen verkleinen om erna te kunnen overgaan tot een lokale therapie (operatie of radiotherapie), met oog op genezing.

Verloop van de therapie

Na drie of vier cycli chemotherapie zal een CT-grafisch nazicht worden doorgevoerd. Bij gunstige evolutie (afname) zal in team de mogelijkheid tot een operatie worden besproken.

Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren driewekelijks via opname (vijf nachten) op de afdeling oncologie van het OLV Ziekenhuis in Aalst op T6, 6de verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost op de afdeling T6. Meer praktische informatie kan u terugvinden in de informatiebrochure die u krijgt bij het secretariaat Radiotherapie-Oncologie.

olv Top in Zorg.

Voor elke toediening wordt een bloedstaal afgenomen. De behandelende arts zal informeren naar eventuele neveneffecten. Bij onvoldoende recuperatie van de bloedcellen of ernstige neveneffecten kan door de arts beslist worden de therapie met één week uit te stellen of een lagere dosis toe te dienen.

Om de nieren te beschermen, krijgt u de dag van de toediening van Cisplatinum® (dag één van elke cyclus) veel vocht via uw infuus toegediend. De infusie van Taxotere®, die ook de eerste dag van de cyclus gegeven wordt, duurt 60 minuten. Daarna wordt 5FU® gedurende vijf dagen continu toegediend (maandag tot en met zaterdag).

Bij het einde van de chemotherapie zal een onderhuids spuitje worden gegeven ter stimulatie van de aanmaak van witte bloedcellen, om zo het risico op infectie te verminderen. Ook zal gedurende 10 dagen preventief antibiotica worden gegeven (Ciproxine®, 2x/dag).

Nevenwerkingen van de therapie

Frequente nevenwerkingen

- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met risico op infecties of bloedarmoede
- Misselijkheid en braken
- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust en smaakverandering (metaalsmaak)
- Mondslijmvliesontsteking
- Haarverlies

Minder frequente nevenwerkingen

- Irritatie en/of tranen van de ogen en neusloop, bloedneus
- Achteruitgang van de nierfunctie
- Spierpijn

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Gehoorvermindering of oorsuizen
- Zenuwprikkeling-of pijn (neurotoxiciteit)
- Ophouden van vocht: gezwollen enkels of kortademigheid
- Allergische reactie op Taxotere®

Specifieke richtlijnen

Om overgevoeligheidsreacties op Taxotere® te voorkomen dient de volgende premedicatie te worden genomen: 32 mg Medrol® of 8 mg Dexamethason, in te nemen de dag voor de opname, één pilletje bij het ontbijt en één bij het avondeten.

Om misselijkheid en braken tot een minimum te beperken, krijgt u 60 min voor de chemotherapie voorbereidende medicatie. U krijgt ook medicatie mee naar huis om klachten van misselijkheid de daaropvolgende dagen te voorkomen of verlichten.

Indien u koorts (twee keer na elkaar >38°C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u zich aan te melden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.

Contactgegevens

Hoofd- en halsoncologie

Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Secretariaat Radiotherapie – Oncologie
Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist
Tel: 053 72 85 15

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 21/03/2023
Goedgekeurd door dokter Greet Huygh