

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist het EC schema toe te dienen als onderdeel van de behandeling van een operabele borsttumor. EC is een combinatietherapie van twee producten:

- Epirubicine (Epirubicine®)
- Cyclofosfamide (Endoxan®)

Deze chemotherapiekuur wordt voorafgaand aan of na heekunde gegeven.

Verloop van de therapie

De toedieningen gebeuren driewekelijks. Er zullen vier cycli EC worden gegeven.

Voorafgaand aan de start van de chemotherapie zal u een hartonderzoek ondergaan om de werking van de hartspier te controleren.

Om veiligheid van de toediening van de chemotherapie te garanderen zal voorafgaand een poortkatheter worden geplaatst.

De verpleegkundige zal voor de start van elke toediening een bloedstaal afnemen via deze katheter. Indien u deze prik als pijnlijk ervaart is er mogelijkheid tot het vooraf aanbrengen van een lokaal verdovende klever of crème. Spreek uw arts hier gerust over aan.

De behandelend arts zal telkens informeren naar eventuele neveneffecten. Bij onvoldoende recuperatie van de bloedcellen of ernstige neveneffecten kan door de arts worden beslist om de therapie met één week uit te stellen.

Voor de inloop van Epirubicine zal u een waterijsje worden aangeboden. Koeling voorkomt ontsteking van de mond en van het mondslijmvlies.

Plaats van toediening

De toedieningen van chemotherapie gebeuren driewekelijks via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op T6 of D6, 6de verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost op de afdeling T6 of D6.

Meer praktische informatie kan u terugvinden in de informatiebrochure die u krijgt bij het secretariaat Radiotherapie-Oncologie.

Nevenwerkingen van de therapie

Frekwente nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Haarverlies
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met het risico op infecties of bloedarmoede
- Tijdelijke rode-oranje verkleuring van de urine
- Uitschakelen van de eierstokfunctie met uitblijven van de menstruatie

Minder frequente nevenwerkingen

- Ontsteking van het mondslijmvlies
- Irritatie en/of tranen van de ogen en neusloop
- Droge huid en overgevoeligheid aan de zon

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Verminderde pompfunctie van het hart

Specifieke richtlijnen

Om misselijkheid en braken tot een minimum te beperken, krijgt u 60 min vóór de chemotherapie voorbereidende medicatie.

U krijgt ook medicatie mee naar huis om klachten van misselijkheid de daaropvolgende dagen te voorkomen of verlichten

Indien u koorts (twee keer na elkaar $>38^{\circ}\text{C}$) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u zich aan te melden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.

Contactgegevens

Borstkliniek

Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Secretariaat Radiotherapie – Oncologie

Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist

Tel: 053 72 49 66

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 15/11/2023

Goedgekeurd door dr. Huygh