

Waarom deze behandeling?

Zoals u heeft vernomen van uw behandelend uroloog, zijn er in uw blaas poliepen gevonden. Deze poliepen blijven beperkt tot het slijmvlies van de blaas en kunnen door middel van een operatie (TUR blaas) via de plasbuis gedeeltelijk of in hun geheel verwijderd worden. Het risico op herval is echter reëel, waarbij de kans bestaat dat de poliepen langzaam agressiever worden en verder in de blaaswand groeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend poliepen te verwijderen. Met behulp van blaasspoelingen is het mogelijk om de kans tot terugkeer van poliepen te verkleinen. Bij u werd gekozen voor blaasspoelingen met BCG. Dit is een tuberculosevaccin waarbij men ontdekt heeft dat het antitumorale eigenschappen bezit. Het remt de lichaamscellen af die ongecontroleerd groeien in de blaas en zorgt voor verbetering van de lokale weerstand tegen tumoren.

Het behandelingsschema

Start en verloop van het behandelingsschema kan van patiënt tot patiënt verschillen. Meestal start de behandeling 4 tot 6 weken na de TUR blaas. Afhankelijk van het behandelingschema kan de behandeling enkele weken duren. Nadien worden er controle blaasbiopsies of een controle cystoscopie gepland ter opvolging. Als onderhoudsdosis kunnen de blaasspoelingen op een minder regelmatige basis verdergezet worden.

Vorbereiding van het onderzoek

U hoeft niet nuchter te zijn. Vermijd 4 uur voor en 2 uur na de spoeling cafeïne houdende dranken en/of grote vochtinname. Hierdoor zal u er beter in slagen de vloeistof minimum 1 uur op te houden. Bij koorts, urineweginfectie of bloed in de urine dient u de uroloog te verwittigen en zal de behandeling uitgesteld worden.

Inschrijving

U moet zich *elke keer inschrijven* aan het onthaal op het gelijkvloers, zowel op Campus Aalst (X-2) als op Campus Ninove.

De behandeling

De behandeling gebeurt in liggende houding op een bed. Na het ontsmetten van de genitaliën plaatst de verpleegkundige een dun kathetertje via de plasbuis tot in de blaas. Dit is niet pijnlijk, wel onaangenaam. Een urinestaal wordt genomen en de resterende urine kan aflopen in een bedpan of urinaal. Nadien wordt het medicijn onder de vorm van een spoelvloeistof via dezelfde katheter ingebracht en nagespoeld met fysiologisch water. De katheter wordt verwijderd.

Na 1u mag u de vloeistof zittend uitplassen. Het toilet wordt door-
gespoeld met gesloten deksel.

Bijwerkingen

De dag van de spoeling en de dag erna kunt u last hebben van een branderig gevoel tijdens het plassen. U kan ook het gevoel hebben dat u

frequenter moet plassen, moeilijker plast of bloed plast. Deze symptomen verdwijnen meestal spontaan. Het is daarom ook aangeraden om veel te drinken. De eerste 2 dagen kan u zich ook griepig voelen: lichte koorts, vermoeidheid, hoofdpijn of spierpijn.

Contacteer ons wanneer u last heeft van:

- Koorts meer dan 38,5°C
- Blijvend griepig gevoel met hoofd- en spierpijn, gewrichtspijnen, misselijkheid
- Blijvende pijn bij het urineren
- Blijvend bloed bij het urineren
- Veralgemeende jeuk of netelroos

De ochtend van de spoeling wordt u sowieso gecontroleerd door de verpleegkundig coördinator om te zien of u geen klachten heeft. Indien alles goed is kan de blaasspoeling doorgaan.

Nacontroles

Om het effect van de spoelingen te controleren, zal uw uroloog regelmatig in uw blaas kijken (cystoscopie) en de urine controleren op ontsteking en poliepcellen. Eventueel worden bijkomende nierfoto's gemaakt.

Nazorg

De eerste 2 dagen plast u best zittend om spatten te voorkomen. Het toilet spoelt u door met gesloten deksel om spatten te vermijden. De eerste 8 uur na de spoeling spoelt u het toilet ook best door met bleekwater. Na het plassen moet u steeds de handen wassen en dit tot 8 uur na de behandeling. Bevuilde kleren en ondergoed kunnen gewoon in

de was. Bij morsen van urine buiten het toilet, de vloer goed reinigen. Behoudens huishoudelijke maatregelen en normale hygiëne zijn er geen extra voorzorgen nodig voor de kinderen of volwassenen in uw omgeving. Er wordt aangeraden om de dag van de spoeling en de dag erna geen geslachtsgemeenschap te hebben. Eenmaal u het product hebt uit geplast, dient u de eerste 6 uur veel te drinken om de resten van het BCG zo snel mogelijk uit de blaas te spoelen.

Ter preventie van bijwerkingen raden wij u aan om volgende medicatie te gebruiken:

- Dag van de spoeling 's avonds Ofloxacin 200mg
- Dag na de spoeling 's ochtends Ofloxacin 200mg
- Bij veel last kan eventueel een NSAID (ontstekingsremmer) overwogen worden. Bijvoorbeeld: suppo Dolcidium 50mg op de ochtend en avond van de spoeling.

Contactgegevens Dienst Urologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 43 78 - Fax: 053 72 44 11
Urologie.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse
Tel: 02 300 61 11 - Fax: 02 300 62 98
Urologie.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove
Tel: 054 31 21 11 - Fax: 054 31 20 59
Urologie.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 05/12/2018

Goedgekeurd door dokter Alex Mottrie