

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist om een behandeling te starten met panitumumab (Vectibix®).

Deze doelgerichte therapie kan alleen (monotherapie) of in combinatie met andere cytostatica worden toegediend .

Panitumumab is een molecule (meer bepaald een monoklonaal antilichaam) die zich bindt op een receptor (of ontvanger) aan de oppervlakte van bepaalde kankercellen (namelijk de EGF-receptor). Door deze binding wordt de kankercel beperkt in groei en ontwikkeling.

De behandeling met panitumumab heeft slechts zin als in de kankercellen een bepaald gen (het RAS-gen) niet gewijzigd is. Uw arts heeft dit voorafgaand aan de behandeling laten nakijken.

Verloop van de therapie

Deze therapie wordt volledig via infuus gegeven en kan via een dagopname worden georganiseerd. U dient hiervoor dus niet te overnachten. Eén kuur duurt twee weken, waarbij steeds op dag één panitumumab wordt gegeven. De eerste toediening van panitumumab loopt over 60 minuten, in uitzonderlijke gevallen over 90 minuten. Vanaf de tweede cyclus worden de toedieningen over 30 minuten gegeven.

| Product | Dag | | | Toedieningswijze |
|--------------------|-----|------|----|--|
| | 1 | 2-14 | 15 | |
| Panitumumab | X | | X | Infuus over 30 minuten (1 ^{ste} keer over 60 minuten; soms over 90 minuten) |

Voor elke nieuwe toediening zal telkens een bloedafname gebeuren.

Het aantal kuren behandeling zal uw arts met u bespreken. Na gemiddeld 2 tot 3 maanden gebeurt een herevaluatie door middel van een gericht bloedonderzoek en radiologische onderzoeken. Soms is uitstel van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren tweewekelijks via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequente nevenwerkingen

- Huidreacties met uitslag, roodheid of een droge huid (met jeuk, afschilfering of gebarsten huid), klik [hier](#)
- Acnévormige uitslag
- Nagelafwijkingen, klik [hier](#)

Minder frequente nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Diarree , klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)
- Kortademigheid en hoesten
- Daling van het magnesiumgehalte in het bloed met mogelijks spierkrampen

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Overmatige haargroei
- Allergische reactie, klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

Het risico op onpasselijkheid of een overgevoelighedsreactie is laag, waardoor voorafgaande medicatie normaal niet noodzakelijk is.

Aarzel, bij problemen of vragen, niet uw behandelend arts of sociaal verpleegkundige/maatschappelijk assistente te contacteren.

Succes met de behandeling!

Contactgegevens

Digestieve oncologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 70 65

digestieve.oncologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 20/02/2019

Goedgekeurd door dokter Koen Hendrickx