

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist een therapie met crizotinib (Xalkori®) te geven. Deze behoort tot de 'doelgerichte therapieën', omdat ze ontwikkeld zijn om zich te richten op bepaalde kenmerken van de kankercellen die niet aanwezig zijn op normale cellen.

Verloop van de therapie

De medicatie wordt gegeven in de vorm van capsules. Crizotinib (Xalkori®) wordt tweemaal daags ingenomen, het best op hetzelfde tijdstip van de dag, en kan met of zonder voeding ingenomen worden.

De duur van de therapie hangt af van het effect van de therapie en hoe u de therapie verdraagt. De behandeling kan worden aangepast afhankelijk van hoe u deze verdraagt.

Maandelijks komt u langs bij de arts voor een controle. Twee maanden na de start van inname van de medicatie gebeurt een herevaluatie met CT-scan, nadien is dit om de drie maanden.

Plaats van toediening

Wanneer u op controle komt bij de arts, krijgt u crizotinib (Xalkori®) mee. U neemt de tabletten thuis in zoals voorgeschreven, u hoeft dus niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. De medicatie is enkel in het ziekenhuis te verkrijgen.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequente nevenwerkingen

- Effecten op het gezichtsvermogen (lichtflitsen, wazig zien)
- Misselijkheid met of zonder braken, klik [hier](#)
- Diarree of obstipatie, klik [hier](#) of klik [hier](#)
- Verminderde eetlust en/of smaakveranderingen, klik [hier](#)
- Oedeem (vochttopstapeling)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)

Minder frequente nevenwerkingen

- Verminderd aantal rode bloedcellen, klik [hier](#)
- Duizeligheid
- Tintelingen in vingertoppen of tenen, klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

U neemt één capsule 's morgens en één capsule 's avonds, met of zonder voeding. U neemt de medicatie best op hetzelfde tijdstip van de dag in. Slik de capsule in zijn geheel door, zonder erop te kauwen, de capsule op te lossen of open te maken.

Wanneer u een dosis bent vergeten, neemt u de gemiste dosis best zo snel mogelijk in, tenzij het minder dan 6 uur is tot de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis (twee capsules tegelijk) om een vergeten capsule in te halen!

Als u moet braken nadat u een capsule hebt genomen, neem dan geen extra dosis in maar neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

Eet geen pompelmoes en drink geen pompelmoessap. Dit kan de werking van crizotinib (Xalkori®) nadelig beïnvloeden.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts of sociaal verpleegkundige/maatschappelijk assistente te contacteren.

Succes met de behandeling!

Contactgegevens



Campus Aalst

Moorselbaan 164 – 9300 Aalst

Hoe kan u ons contacteren?

- Tel: 053/72 40 32
- Long.onco@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 07/09/2020

Goedgekeurd door dokter Kurt Tournoy