


Samenstelling van de therapie

Bortezomib is een geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van multipel myeloom. Het geneesmiddel remt het proteasoom (zie hiervoor onderstaand figuur). Dit is een complexe structuur binnen de myeloom cel die verantwoordelijk is voor de afbraak van eiwitten. De kwaadaardige myeloom cel maakt zeer grote hoeveelheden van deze eiwitten aan. Door de afbraak hiervan te remmen, leidt dit tot de celdood van de myeloom cel.



Verloop van de therapie

Bortezomib wordt toegediend als onderhuidse (subcutane) inspuiting in de bovenarm, dij of buik.

De plaats van inspuiting dient steeds afgewisseld te worden.

Het wordt ofwel wekelijks ofwel twee maal per week toegediend.

De toediening zelf duurt slechts enkele minuten.

Plaats van de toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdiep in het oude gebouw. De behandeling vereist niet dat U in het ziekenhuis blijft slapen.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van de afdeling C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent

- Beschadiging van de zenuwen (neuropathie), klik [hier](#)
- Tekorten aan bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Diarree, klik [hier](#)

- Constipatie, klik [hier](#)
- Verhoogd risico op herpes infecties
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)

Zeldzaam

- Ontstekingen van het oog, klik [hier](#)
- Tekorten aan witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Huiduitslag, klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

Gebruik van bortezomib kan een beschadiging van de zenuwbanen veroorzaken (neuropathie). Dit kan gepaard gaan met gevoelsstoornissen o.a. voosheidsgevoel in de vingertoppen, tintelingen, gestoorde temperatuurswaarneming en zelfs pijnklachten. Ook kunnen er stoornissen ontstaan van het autonome zenuwstelsel wat kan leiden tot duizeligheid en seksuele disfunctie.

De meeste neuropathie is vrij mild en verdwijnt in de regel bij stopzetten van bortezomib. De klachten kunnen echter wel soms maanden na stopzetten van het geneesmiddel aanhouden. Indien U tijdens de behandeling toenemende klachten van neuropathie ontwikkeld, kan uw behandelend hematoloog de dosis en/of de toedieningsfrequentie minderen.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 05/03/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier