


Samenstelling van de therapie

Ruxolitinib is een oraal geneesmiddel dat gebruikt wordt voor de behandeling van sommige vormen van myelofibrose en van polycythaemia vera (ziekte van Vaquez).

Het geneesmiddel remt o.a. het JAK kinase. Dit is een eiwit dat de cellen aanzet tot celdeling. Hierdoor remt het de groei van de cellen. Het geneesmiddel leidt ertoe dat de milt verkleint, de klachten van vermoeidheid, nachtzweeten en koorts verminderen en de eetlust toeneemt.



Figuur: Ruxolitinib remt het JAK kinase. Dit eiwit zet de cellen aan tot celdeling.

Verloop van de therapie

Ruxolitinib bestaat in pillen van 5, 10, 15 en 20 mg. Uw behandelend hematoloog zal voor U de geschikte dosis bepalen. Klassiek wordt ruxolitinib twee maal per dag ingenomen, dit is 's morgens en 's avonds, telkens op hetzelfde uur van de dag.

Het geneesmiddel mag zowel met of zonder voedsel worden ingenomen.

Indien U vergeten bent ruxolitinib in te nemen, mag U de gemiste dosis overslaan. Neem nooit een dubbele dosis in. Indien U braakt na inname van ruxolitinib dient U ook geen nieuwe dosis in te nemen.

Ruxolitinib kan enkel afgeleverd worden door de ziekenhuisapotheek. U zal van uw behandelend hematoloog een voorschrift krijgen waarmee U zich naar de ziekenhuisapotheek kan wenden.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

De nevenwerkingen van nilotinib zijn meestal mild.

Frequent

- Tekort aan rode bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekort aan bloedplaatjes, klik [hier](#)

Zeldzaam

- Hartritmestoornissen

- Kortademigheid
- Duizeligheid
- Winderigheid
- Hoofdpijn

Specifieke richtlijnen

De werking van ruxolitinib kan beïnvloed worden door de inname van bepaalde geneesmiddelen. Dit zijn o.a. geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van schimmelinfecties, hartritmestoornissen en bloedverdunners. Meld nieuwe medicatie steeds aan uw behandelend hematoloog.

Ook het drinken van (grote hoeveelheden) pompelmoes sap kan de werking van ruxolitinib verstoren. Probeer dit tot een minimum te beperken. Andere vruchtensappen zijn perfect veilig.

Ook de inname van Sint-Janskruid (welke gebruikt wordt als "plantaardig" slaapmiddel) dient vermeden te worden.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier