


### Samenstelling van de therapie

Idelalisib wordt gebruikt voor de behandeling van Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) en folliculair lymfoom. Het geneesmiddel remt een eiwit in de kwaadaardige cel, het fosfoinositide 3-kinase (PI3K). Hierdoor remt het de groei van de kankercel.



Figuur: Idelalisib remt het fosfoinositide 3-kinase (PI3K) eiwit

# Verloop van de therapie

Idelalisib wordt als harde capsules van 150 of 100 mg afgeleverd. De capsules dienen 2 maal per dag ingenomen te worden ('s morgens en 's avonds).

Idelalisib dient ingenomen te worden zonder op de capsule te kauwen met een groot glas water. Neem de capsules steeds op hetzelfde moment van de dag in.

Indien U vergeet idelalisib in te nemen, mag U de gemiste dosis inhalen indien er minder dan 6 uur verstreken is. Indien er meer dan 6 uur verstreken zijn, slaat U best deze dosis over. Neem nooit een dubbele dosis de dag erna in. Indien U braakt na inname van idelalisib dient U geen nieuwe capsules in te nemen.

Idelalisib kan enkel afgeleverd worden door de ziekenhuisapotheek. U zal van uw behandelend hematoloog een voorschrift krijgen waarmee U zich naar de ziekenhuisapotheek kan wenden.

# Nevenwerkingen van de therapie

*Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).*

*Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.*

## Frequent

- Huiduitslag, klik [hier](#)
- Diarree, klik [hier](#)
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)

- Tekorten aan witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekorten aan bloedplaatjes, klik [hier](#)

## Zeldzaam

- Kortademig en hoesten

## Specifieke richtlijnen

Idelalisib kan aanleiding geven tot ernstige maar gelukkig zeldzame longinfecties. Hiervoor zal uw behandelend hematoloog U een preventieve antibiotica behandeling voorschrijven (met Bactrim of Eusaprim). Indien U toch merkt dat U meer en meer kortademig wordt of U aanhoudend dient te hoesten, dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog.

Idelalisib kan aanleiding geven tot diarree. U dient contact op te nemen met uw behandelend hematoloog indien de diarree bloederig is of gepaard gaat met ernstige buikkrampen.

De inname van idelalisib kan beïnvloed worden door de inname van bepaalde geneesmiddelen. Dit zijn o.a. geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van schimmelinfecties, hartritmestoornissen en bloedverdunners. Meld nieuwe medicatie steeds aan je behandelend hematoloog.

Ook het drinken van (grote hoeveelheden) pompelmoes sap kan de werking van idelalisib verstoren. Probeer dit tot een minimum te beperken. Andere vruchtensappen zijn perfect veilig. Ook Sint-Janskruid (welke gebruikt wordt als plantaardig slaapmiddel) dient vermeden te worden.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

## Contactgegevens Dienst Hematologie

### Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

#### Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier