


Samenstelling van de therapie

Deferasirox bevordert de uitscheiding van ijzer (het is een ijzer chelator). Het geneesmiddel kan gebruikt bij patiënten met myelodysplasie, bèta-thalassemie en sikkelcelanemie die herhaalde rode bloedcel transfusies dienen te krijgen.

Door een correcte eliminatie van ijzer kan op lange termijn schade aan de organen (hart, lever, enz.) vermeden worden.



Figuur: twee molecules deferasirox (links en rechts) binden ijzer (centraal).

Verloop van de therapie

Deferasirox wordt als film omhulde tabletten van 90, 180 en 360 mg afgeleverd.

De aanbevolen startdosis bedraagt 14 mg/kg/dag en wordt geleidelijk opgedreven tot een maximum van 28 mg/kg/dag op aangeven van uw hematoloog.

Deferasirox dient ingenomen te worden met een glas water. U neemt het geneesmiddel ofwel nuchter is, ofwel met een lichte maaltijd. Het maakt niet uit wanneer U dit inneemt, maar best gebeurt dit op hetzelfde moment van de dag. Voor patiënten die niet in staat zijn om tabletten in hun geheel door te slikken, kunnen de tabletten worden verpulverd en worden ingenomen met yoghurt of appelmoes.

Indien U vergeet deferasirox in te nemen, mag U de gemiste dosis inhalen indien er minder dan 6 uur verstreken is. Indien er meer dan 6 uur verstreken zijn, slaat U best deze dosis over. Neem nooit een dubbele dosis de dag erna in. Indien U braakt na inname van deferasirox dient U geen nieuwe tabletten in te nemen.

Deferasirox kan enkel afgeleverd worden door de ziekenhuisapothek. U zal van uw behandelend hematoloog een voorschrift krijgen waarmee U zich naar de ziekenhuisapothek kan wenden.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

Frequent

- Stoornissen in de nierfunctie

- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Diarree, klik [hier](#)
- Constipatie, klik [hier](#)
- Stoornissen in levertesten
- Jeuk
- Huiduitslag, klik [hier](#)

Zeldzaam

- Keelpijn
- Vermoeidheid, klik [hier](#)
- Koorts
- Duizeligheid

Specifieke richtlijnen

Er zullen regelmatig bloed- en urinetesten bij u worden afgenomen tijdens de behandeling. Met deze testen wordt de hoeveelheid ijzer gecontroleerd. Bij deze afnames zullen ook uw nier en leverfunctie getest worden.

De inname van deferasirox kan beïnvloed worden door de inname van bepaalde geneesmiddelen. Dit zijn o.a. geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van een verhoogd cholesterol, epilepsie en tuberculose. Meld nieuwe medicatie steeds aan je behandelend hematoloog.

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier