Digestieve Oncologie

INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Folfoxiri

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist om chemotherapie op basis van irinotecan, oxaliplatinum, 5-fluorouracil (5-FU) en levofolinezuur (foliumzuur) te starten.

Verloop van de therapie

Deze therapie wordt volledig via infuus gegeven. Eén kuur duurt veertien dagen waarvan er gedurende de eerste drie dagen chemotherapie wordt gegeven. Hiervoor dient u, met uitzondering van de eerste toediening, niet in het ziekenhuis te overnachten.

Op de eerste dag van elke behandelingscyclus worden oxaliplatinum, irinotecan, 5-fluorouracil en levofolinezuur via infuus toegediend. Nadien wordt een pompje met chemotherapie (5-fluorouracil) aan de poortkatheter gekoppeld. Dit pompje blijft gedurende 46 uur ter plaatse en geeft continu een kleine hoeveelheid chemotherapie vrij. Met dit pompje kunt u indien gewenst naar huis. Klik **hier** voor de infobrochure van het pompje. Het afkoppelen van de pomp gebeurt na de eerste toedieningen bij voorkeur in het ziekenhuis. Na enkele toedieningen gebeurt dit door uw thuisverpleegkundige. Na het afkoppelen van de infusor volgen 11 dagen rust vooraleer met een nieuwe kuur wordt gestart.

olv Top in Zorg.

Product	Dag				Toedieningswijze
	1	2	3	4-14	
Levofolinezuur	X				Infuus over 2 uur
Oxaliplatinum	X				Infuus over 2 uur
Irinotecan	X				Infuus over 60 minuten (1ste keer over 90 minuten)
5-FU pomp	X	→	X		Infuus over 46 uur

Voor elke nieuwe toediening zal telkens een bloedafname gebeuren. Het aantal kuren behandeling zal uw arts met u bespreken. Na gemiddeld 2 tot 3 maanden gebeurt een herevaluatie door middel van een gericht bloedonderzoek en radiologische onderzoeken. Soms is uitstel van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen.

Plaats van toediening

De toedieningen gebeuren tweewekelijks via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6de verdiep in het oude gebouw.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van het oncologisch dagziekenhuis op C6. Klik **hier** voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

*Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik **hier**'. Voor de algemene infobrochure klik **hier**.*

*Klik **hier** voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.*

Frequente nevenwerkingen

- Tijdelijke onderdrukking van beenmerg, klik **hier**
- Vermoeidheid, klik **hier**
- Verminderde eetlust en/of smaakverandering, klik **hier**
- Misselijkheid en braken, klik **hier**
- Diarree, klik **hier**
- Neurotoxiciteit, klik **hier**
- Uitdunnen van het haar, klik **hier**

Minder frequente nevenwerkingen

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies, klik **hier**
- Toesnoerend gevoel in de keel
- Hand-voet syndroom (droge rode handen en voeten; uitzonderlijk kunnen blaren ontstaan), klik **hier**
- Haaruitval, klik **hier**

Specifieke richtlijnen

Vóór de chemotherapie wordt medicatie ter preventie van misselijkheid en braken gegeven. Deze medicatie wordt via de mond of via infuus gegeven. U krijgt ook medicatie mee naar huis om misselijkheid te voorkomen of te behandelen.

Concreet: van dag 2 tot en met dag 4 van de chemotherapie dient u telkens 1 comprimé Medrol® 32mg in te nemen.

Soms wordt een lage dosis atropine gegeven ter preventie van acute bijwerkingen die kunnen optreden bij de toediening van irinotecan (het zogenaamde "acuut cholinerg syndroom" dat zich kenmerkt door zweten, buikpijn, diarree, tranenvloed, overvloedige speekselproductie en gezichtsstoornissen).

Soms is het ook nodig om thuis nog groeifactoren toe te dienen om de groei van de witte bloedcellen te stimuleren (Neulasta®). Deze toediening gebeurt onderhuids en éénmaal daags, gebruikelijk op dezelfde dag als het afkoppelen van de infusor.

Tijdens de toediening van oxaliplatinum mag u geen koude dranken drinken. Zolang de behandeling met oxaliplatinum loopt (ook thuis) moet u blootstelling aan koude vermijden (bv. door het dragen van handschoenen).

Aarzel, bij problemen of vragen, niet uw behandelend arts of sociaal verpleegkundige/maatschappelijk assistente te contacteren.

Succes met de behandeling!

Contactgegevens

Digestieve oncologie
Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Tel: 053 72 70 65
digestieve.oncologie@olvz-aalst.be

D i s c l a i m e r

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 20/02/2019
Goedgekeurd door dokter Koen Hendrickx