



SGLT2 REMMERS BIJ TYPE 1 DIABETES

(Forxiga®, Invokana®, Jardiance®)

Kunnen DKA veroorzaken, vaak zonder verhoging van glycemie!!!

INFORMATIE VOOR DE ZORGVERSTREKKERS

Denk aan **euglycemische DKA** (= ketonen, acidose, maar redelijke BG)

- Bij misselijkheid, braken of algemene achteruitgang (kortademig, suf)
- Ongeacht de bloedsuikerspiegel (blijft vaak laag door het uitplassen van suiker)
- **Meet dringend bloedketonen!!!**

Bij DKA

1. Overleg met endocrinoloog van wacht.
2. Start specifiek euglycemisch DKA behandelingschema (je zal sneller glucose moeten bijgeven dan bij hyperglycemische DKA. Glucose en insuline zijn nodig om de ketonproductie stil te leggen).
3. Zet de SGLT2 remmer op wacht.



SGLT2 REMMERS BIJ TYPE 1 DIABETES

(Forxiga®, Invokana®, Jardiance®)

Kunnen DKA veroorzaken, vaak zonder verhoging van glycemie !!!

RICHTLIJNEN VOOR DE PATIËNT

Stop de suikerplaspil bij

- Nuchter blijven (voor onderzoek of operatie)
- ZEKER als u zich misselijk voelt

Meet ketonen

- Als u zich misselijk of niet helemaal lekker voelt, ongeacht of uw suiker verhoogd is

Bel het diabetesteam

- Als de ketonen niet dalen
- Zeker bij braken of alsmar zieker worden.

BRAKEN = BELLEN!



053/72 44 88 binnen kantooruren (vraag diabeteseducator)

053/72 45 63 buiten kantooruren (vraag de diabetoloog van wacht)

Als ketonen 0.6 of hoger

1. Stop de suikerplaspil onmiddellijk
2. Eet 15-30 g koolhydraten (equivalent van 1 tot 2 boterhammen)
3. Geef hierbij een extra dosis snelwerkende insuline ($\pm 1.5x$ wat u normaal zou geven voor die hoeveelheid koolhydraten)
4. Drink veel water
5. Controleer suiker en ketonen na 2 uur
6. Herhaal de maatregelen als de ketonen nog steeds > 0.6 zijn
7. Als je een insulinepomp gebruikt vervang bij de minste twijfel infuusset en insuline!



Kom naar Spoed als de situatie verslechtert!



Toon dit kaartje onmiddellijk aan de urgentiedienst!