

## Wat is Azathioprine?

Azathioprine (Imuran®) is een geneesmiddel dat een invloed heeft op het afweersysteem. Het onderdrukt de celdeling van ontstekingscellen.

Het wordt toegediend bij patiënten met reumatische aandoeningen, omdat het ontstekingen kan afremmen en pijn en zwelling kan verminderen. Azathioprine heeft ook een cortisonesparend effect.

## Werking

Azathioprine werkt pas optimaal 8 tot 12 weken na start van inname. De dosis kan aangepast worden in de loop van de behandeling. Het mag ook gecombineerd worden met andere medicatie zoals pijnstillers of andere ontstekingsremmende medicatie.

Overleg steeds met uw behandelende arts wanneer u wilt stoppen met Azathioprine.

# Inname

- Azathioprine bestaat uit tabletten van 25 en 50 mg. Een of meerdere doseringen per dag zijn mogelijk.
- De tabletten dienen in zijn geheel doorgeslikt te worden.
- Azathioprine tabletten mogen niet fijn gemalen of gekauwd worden.

# Bijwerkingen

- Maagdarmklachten zoals misselijkheid, braken, verminderde eetlust of diarree kunnen optreden kort na het starten met Azathioprine. Inname van Azathioprine voor het slapengaan kan deze bijwerkingen verminderen.
- Er kan huiduitslag optreden. Dit is een allergische reactie en zal verdwijnen bij het stoppen van Azathioprine.
- Op langere termijn kan er een verhoogde kans op infectie optreden.
- Haaruitval
- Azathioprine kan ook invloed hebben op de aanmaak van de bloedplaatjes (deze zijn van belang voor de bloedstolling), of kan leverfunctiestoornissen geven.
- Door op regelmatige basis bloedcontroles te doen (om de twee of drie maand) kunnen deze nevenwerkingen tijdig opgespoord worden.

# Aandachtspunten

- Indien u blauwe plekken hebt op het lichaam of andere lichamelijke veranderingen vaststelt, neem dan contact op met uw reumatoloog.
- Indien u Zyloric® neemt of een ander urinezuurverminderend medicament dient u dit aan uw arts te melden. Imuran® mag nooit gecombineerd worden met Zyloric® of Allopurinol®. Deze medicatie kan de nevenwerkingen van Azathioprine verhogen.
- Bij aanhoudende koorts dient u contact op te nemen met uw behandelende arts.

# Zwangerschap

Azathioprine dient op korte termijn gestopt te worden in geval van zwangerschapswens. Daarnaast mag het ook niet genomen worden tijdens de zwangerschap zelf. Ook tijdens borstvoeding dient Azathioprine gestopt te worden.

In zeldzame gevallen kan in overleg met uw specialist Azathioprine tijdens de zwangerschap toch verder gezet worden.

# Contactgegevens Dienst Reumatologie

## Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 79 65

Reumato.Aalst@olvz-aalst.be

## Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 61 09

Reumato.Asse@olvz-aalst.be

## Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 61

Reumato.Ninove@olvz-aalst.be

## Disclaimer

*De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.*

Versie 16/01/2019

Goedgekeurd door dokter Van  
Hoydonck