

Methotrexaat (Ledertrexate[®], Metoject[®])

Methotrexaat werkt aan de basis van het ontstekings- of ziekteproces, namelijk het afweersysteem. Hierdoor worden ontstekingen afgeremd en wordt eventuele (gewrichts)beschadiging die kan ontstaan ten gevolge van ontsteking, vertraagd of gestopt.

Methotrexaat begint pas 8 tot 12 weken na de eerste inname te werken en is werkzaam op lange termijn mits langdurige toediening.

Overleg met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van methotrexaat.

Indien gewenst kan methotrexaat jarenlang gebruikt worden.

Inname

Methotrexaat wordt 1x/week toegediend:

- Onder de vorm van tabletten (2,5 mg) via de mond en bij voorkeur tijdens de maaltijd, verdeeld over 1 tot meerdere innames per dag.
- In de vorm van subcutane inspuitingen die door de patiënt zelf kunnen toegediend worden.
- Via intramusculaire inspuiting wat door een thuisverpleegkundige wordt geplaatst.

Vaak wordt er opgestart via een schema dat toelaat de dosis op te drijven of te verminderen afhankelijk van de klachten van de patiënt.

De inname van de tabletten Ledertrexate® kan eventueel vervangen worden door een wekelijkse intramusculaire of subcutane inspuiting in geval van uitgesproken maag- darmklachten.

Mogelijke nevenwerkingen

- Op het aantal bloedcellen en lever- en nierfunctie.
 - Bij verminderde nierwerking wordt er een lagere dosis Ledertrexate® gegeven.
 - Bij stoornissen op de leverfunctie of de bloedcellen kan de dosis worden aangepast. Deze stoornissen zijn omkeerbaar.
- Er zal 3-maandelijks een labocontrole gebeuren door de arts.
- Maag- darmstoornissen zoals misselijkheid kunnen verbeterd worden door de inname van de dosis te spreiden over de dag of door inname van Motilium®.
- Andere mogelijke bijwerkingen zijn:
 - Aften in de mond
 - Lichte haaruitval
 - Verhoogde vatbaarheid voor infecties (verkoudheden, bovenste luchtweginfecties)
- Bij koorts of kortademigheid steeds contact opnemen met je arts en vermelden dat je Methotrexaat inneemt.
- Kortademigheid (zeldzaam).

Zwangerschap

Indien u een zwangerschapswens heeft, bespreek dit met je reumatoloog. Er zal geen behandeling met methotrexaat opgestart worden in geval van zwangerschap of bij patiënten bij wie een zwangerschap op korte termijn wenselijk is, of bij mannelijke patiënten met een kinderwens.

Methotrexaat wordt 3 maand voor conceptie stopgezet.

Foliumzuur

Foliumzuur is een vitamine dat een belangrijke rol speelt in de stofwisseling en deling van verschillende soorten lichaamscellen.

Methotrexaat is een geneesmiddel dat de effecten van foliumzuur in het lichaam tegenwerkt.

De bedoeling van een behandeling met methotrexaat is natuurlijk alleen om de groei van ontstekingscellen af te remmen. Om de gezonde cellen, die voor hun goede werking ook zijn aangewezen op foliumzuur, te beschermen worden tijdens de behandeling met methotrexaat foliumzuursupplementen gegeven.

Dagelijkse inname van 1 tot 2 mg of wekelijkse één inname van 5 mg.

Contactgegevens Dienst Reumatologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 79 65

Reumato.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 61 09

Reumato.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 61

Reumato.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 16/01/2019

Goedgekeurd door dokter Van
Hoydonck