


Samenstelling van de therapie

Elotuzumab is geneesmiddel gebruikt tegen multipel myeloom. Het is een antilichaam gericht tegen SLAMF7. Dit is een eiwit dat aanwezig is op de myeloom cel. Door het binden van dit antilichaam op de cel worden NK cellen van het immuunsysteem geactiveerd tegen myeloom cel. Deze doden op hun beurt de myeloom cel. Het is een vorm van immuun therapie.



Figuur: Elotuzumab herkent SLAMF7, een eiwit op de buitenzijde van de myeloom cel. Dit trekt NK cellen aan die de myeloom cel doden.

Verloop van de therapie

Elotuzumab wordt als intraveneus infuus (d.w.z. via een ader) toegediend.

Alvorens toediening krijgt U medicijnen toegediend om allergische reacties te vermijden.

Elotuzumab wordt toegediend per cyclus. Deze cycli duren 28 dagen (4 weken).

- Cyclus 1 en 2: wekelijkse toediening
- Vanaf cyclus 3: twee wekelijkse toediening

Om reacties te vermijden worden de eerste 2 toedieningen traag toegediend. De eerste toediening duurt ongeveer 3 uur, de tweede toediening 1,5 uur. Indien er geen bijwerkingen optreden, zullen de volgende toedieningen ongeveer 1 uur duren.

Elotuzumab wordt steeds met lenalidomide en dexamethasone toegediend.

Cyclus	Week 1, dag:		Week 2, dag:		Week 3, dag:		Week 4, dag:	
	1	2-7	8	9-14	15	16-21	22	23-28
Cyclus 1								
Cyclus 2								
Vanaf cyclus 3...								

Plaats van de toediening

De toedieningen gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op C6, 6^{de} verdiep in het oude gebouw. De behandeling vereist niet dat U in het ziekenhuis blijft slapen.

U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost van de afdeling C6. Klik [hier](#) voor de infobrochure van C6.

Nevenwerkingen van de therapie

Meer detailinformatie kan u lezen onder specifieke richtlijnen.

Frequent

- Infuusreacties
- Infecties (meestal mild zoals luchtweginfecties)

Specifieke richtlijnen

De voornaamste bijwerking van elotuzumab zijn reacties die ontstaan tijdens of kort na het toedienen van het geneesmiddel: de infusie-reacties. Dit zijn een soort van allergische reacties op het geneesmiddel en om deze zoveel mogelijk te onderdrukken wordt voor toediening van elotuzumab medicijnen toegediend (de zogenaamde pré-medicatie).

De infuusreacties zijn meestal vrij mild en kunnen bestaan uit algemeen onwel gevoel, rugpijn, koorts, rillingen, neusloop, tranende ogen, kortademigheid, lage bloeddruk, misselijkheid, braken, etc..

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier