

Samenstelling van de therapie

Hydroxycarbamide is een oraal geneesmiddel dat o.a. gebruikt wordt voor de behandeling van myeloproliferatieve ziektes, zoals de ziekte van Vaquez (polycythaemia vera), essentiële thrombocytose, myelofibrose etc.

Het geneesmiddel remt de aanmaak van nieuwe bloedcellen.

Verloop van de therapie

Hydroxycarbamide bestaat enkel onder de vorm van capsules van 500 mg. De dosis wordt bepaald door uw behandelend hematoloog. Hydroxycarbamide mag ingenomen worden met of zonder voedsel.

Indien U één capsule dient in te nemen, doet U dat best 's morgens, telkens op hetzelfde moment van de dag. Als U meerdere capsules dient in te nemen, mag U de capsules verspreiden over de dag. De capsules dienen in hun geheel (zonder te kauwen) ingeslikt te worden.

Hydroxycarbamide kan afgeleverd worden door uw eigen apotheek. U zal van uw behandelend hematoloog hiervoor de noodzakelijke voorschriften krijgen bij elke raadpleging (meestal voor 3 maanden).

Het is noodzakelijk dat uw bloedbeeld regelmatig wordt gecontroleerd.

Nevenwerkingen van de therapie

Voor meer detailinformatie kunt u bij bepaalde nevenwerkingen doorklikken op 'klik [hier](#)'. Voor de algemene infobrochure klik [hier](#).

Klik [hier](#) voor de infobrochure omgaan met cytostatica in de thuissituatie.

De nevenwerkingen van hydroxycarbamide zijn eerder zeldzaam en meestal mild.

- Tekort aan rode bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekort aan witte bloedcellen, klik [hier](#)
- Tekort aan bloedplaatjes, klik [hier](#)
- Veranderingen in smaak, klik [hier](#)
- Branderig gevoel in de mond en aftes
- Misselijkheid en braken, klik [hier](#)
- Vermoeidheid, klik [hier](#)
- Verkleuring van de nagels, klik [hier](#)
- Slecht genezende wonden (vnl. aan de benen)
- Diarree, klik [hier](#)
- Constipatie, klik [hier](#)

Specifieke richtlijnen

De inname van hydroxycarbamide kan leiden tot de ontwikkeling van slecht genezende wondes, vnl. aan de benen. Indien dit optreedt, neemt U best sneller contact met uw behandelend hematoloog.

Indien U koorts (dit is temperatuur oraal gemeten boven 38,5 °C) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt dient U contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. Dit kan tijdens de kantooruren door rechtstreeks te bellen naar uw arts. Tijdens de nacht of het weekend dient U te bellen naar de hospitalisatie afdeling Hematologie (T6).

Contactgegevens Dienst Hematologie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 46 59

hematologie@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 22/02/2019

Goedgekeurd door dokter Karel Fostier