


Waarom deze behandeling?

Indien er na klinisch onderzoek en bijkomende beeldvorming geen duidelijke oorzaak gevonden wordt van de pijn kan een diagnostische infiltratie voorzien worden.

Gezien de heup volledig omkapseld is, het is met andere woorden een gesloten ruimte, kunnen we het gewricht zeer selectief gaan verdoven. Wanneer de pijn dan verminderd of verdwijnt, weten we dat het heupgewricht de veroorzaker is van de pijn.



Vorbereiding

Specifiek voor deze ingreep is belangrijk om te weten of u zwanger zou kunnen zijn en of u al dan niet allergisch zou zijn aan contraststof, cortisone of lokale verdoving.

Gelieve dit te melden aan uw behandeld arts en de verpleegkundige op de dagkliniek.

Behandeling

Gezien de heup, in tegenstelling tot de knie en andere gewrichten, relatief diep ligt, moeten we deze aanpakken met behulp van radiografie en contrastmiddel (een soort kleurstof). Deze hebben we enkel voor handen in een operatiezaal of op de dienst radiologie.

De inspuiting gebeurt meestal zonder verdoving, toch kan indien gewenst een lichte roes gegeven worden.

De inspuiting op zich duurt ongeveer 10 minuten.

Het is belangrijk om te weten dat bij de inspuiting 3 vloeistoffen worden ingespoten:

- Contraststof (een soort kleurstof), dit laat ons toe om zeker te zijn dat we in het heupgewricht zitten.
- Een lokale pijnstilller.
- Cortisone.



Risico's en mogelijke alternatieven

De kans op deze verwikkelingen is beperkt.

- Toename van de pijn de eerste dagen.
- Lokale bloeduitstorting.
- Infectie van het gewricht.
- Ontregeling van de glycemie in geval van suikerziekte

Resultaat en kans op succes

De toegediende lokale pijnstiller werkt ongeveer een 6-tal uur. Daarna zal deze uitwerken en zal de pijn tijdelijk terugkeren.

De toegediende cortisone zal na een 3-tal weken zijn effect hebben. Het is dus aan te raden om in dit tijdsinterval kortstondig een onstekingsremmer te nemen.

Na 6 weken zien wij u terug op de consultatie om de resultaten te bespreken.

Nazorg

- Het is belangrijk dat u onmiddellijk na de infiltratie alles gaat doen en meer bepaald de zaken die anders pijn zouden doen, zodanig dat u duidelijk kan aangeven of de pijn na de inspuiting beter is.
- U zal een score systeem meekrijgen, de VAS – score, dewelke u dient in te vullen en terug dient mee te brengen na 6 weken op de consultatie. Dit is een belangrijke vragenlijst omdat het ons toelaat na te gaan in welke mate u pijn beter is.

Contactgegevens Dienst Orthopedie

Campus Aalst

Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Tel: 053 72 43 75

Fax: 053 72 46 46

Orthopedie.Aalst@olvz-aalst.be

Campus Asse

Bloklaan 5 - 1730 Asse

Tel: 02 300 63 30

Orthopedie.Asse@olvz-aalst.be

Campus Ninove

Biezenstraat 2 - 9400 Ninove

Tel: 054 31 20 60

Fax: 054 31 20 59

Orthopedie.Ninove@olvz-aalst.be

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 30/04/2019

Goedgekeurd door dokter A. Mulliez