

Samenstelling van de therapie

In samenspraak met uw arts is er beslist om T-DM1 (Kadzyla[®]) op te starten. T-DM1 is een combinatie van Trastuzumab (Herceptin[®]), een doelgerichte therapie en Emtansine (DM1[®]), chemotherapie.

Beide geneesmiddelen zijn met elkaar verbonden zodat de chemotherapie de weg van de doelgerichte therapie (gericht op het Her2- neu eiwit) volgt.

Hierdoor geeft het minder neveneffecten dan de klassieke combinatie wanneer de doelgerichte therapie en chemotherapie elk afzonderlijk worden toegediend.

De therapie wordt gegeven in de hoop hiermee uw ziekte te verbeteren of te stabiliseren.

Verloop van de therapie

De toedieningen van T-DM1 gebeuren driewekelijks. T-DM1 wordt intraveneus toegediend. Per drie of vier cycli therapie zal een CT-grafisch onderzoek gebeuren.

Tijdens uw behandeling met T-DM1 zal uw behandelende arts regelmatig een hartonderzoek laten uitvoeren.

De therapie wordt verder toegediend zolang de ziekte onder controle blijft en de neveneffecten dit toelaten.

Plaats van toediening

De toedieningen van chemotherapie gebeuren via het oncologisch dagziekenhuis van het OLV Ziekenhuis in Aalst op T6 of D6, 6de verdiep in het oude gebouw. U moet zich telkens eerst laten inschrijven aan het onthaal (X-2). Nadien mag u zich aanmelden bij de verpleegpost op de afdeling T6 of D6.

Voor elke toediening wordt een bloedstaal afgenomen. Uw behandelend arts zal informeren naar eventuele nevenwerkingen. Bij onvoldoende recuperatie van de bloedcellen of ernstige neveneffecten kan door de arts beslist worden de therapie met één week uit te stellen of een lagere dosis toe te dienen.

Meer praktische informatie kan u terugvinden in de informatiebrochure die u krijgt bij het secretariaat Radiotherapie-Oncologie.

Nevenwerkingen van de therapie

Frekwente nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Afwijkende laboresultaten (bloedplaatjes en levertesten)

Minder frequente nevenwerkingen

- Haarverlies

Eerder zelden voorkomende nevenwerkingen

- Allergische reacties

Eet geen pompelmoes of drink geen pompelmoessap tijdens de periode dat u in behandeling bent. Deze kunnen de werking van T-DM1 nadelig beïnvloeden.

Specifieke richtlijnen

Om misselijkheid en braken tot een minimum te beperken, krijgt u 30 min voor de chemotherapie voorbereidende medicatie. U krijgt ook medicatie mee naar huis om klachten van misselijkheid de daaropvolgende dagen te voorkomen of verlichten.

Indien u koorts (twee keer na elkaar $>38^{\circ}\text{C}$) of aanhoudende nevenwerkingen ontwikkelt, dient u contact op te nemen met uw behandelend arts of huisarts. Tijdens de nacht of het weekend dient u zich aan te melden via de dienst spoedgevallen.

Aarzel niet om bij problemen of vragen uw behandelend arts, verpleegkundig specialist of maatschappelijk werker te contacteren.

Succes met de behandeling.

Contactgegevens

Borstkliniek

Campus Aalst
Moorselbaan 164 - 9300 Aalst

Secretariaat Radiotherapie – Oncologie

Tel: 053 72 44 79

Verpleegkundig specialist

Tel: 053 72 49 66

Disclaimer

De informatie in deze brochure is van algemene aard en is bedoeld om u een globaal beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In iedere situatie, en dus ook de uwe, kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze brochure vervangt dus niet de informatie die u van uw behandelend arts reeds kreeg en die rekening houdt met uw specifieke toestand. Zijn er na het lezen van deze brochure nog vragen schrijf deze eventueel op en bespreek ze in ieder geval met uw behandelend arts.

Versie 15/11/2023

Goedgekeurd door dr. Huygh