

Uw arts heeft een borstonderzoek op dienst Medische Beeldvorming aangevraagd.

In deze brochure krijgt u meer uitleg over deze onderzoeken.

Aarzel niet om uw aanvragende arts te contacteren indien u nog verdere inlichtingen wenst.

Inschrijving

1. U dient zich 30 minuten voordien aan te melden op de dienst 'Inschrijvingen' van het ziekenhuis.
2. Vervolgens gaat u naar het secretariaat van de dienst 'Medische Beeldvorming'.
3. Breng steeds volgende documenten mee:
 - Identiteitskaart
 - Aanvraagformulier van de verwijzende arts
 - Eventueel vorige foto's van de borst

Echografische corebiopsie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens een echografie. De radioloog maakt enkele echobeelden en prikt na lokale verdoving met een naald in de borst om zo een stukje weefsel te verwijderen. Dit weefsel wordt in het laboratorium verder onderzocht.

Vorbereiding

U mag GEEN bloedverduunners innemen. Informeer uw arts als u bloedverduunners inneemt. Na het onderzoek mag u NIET zelf met de auto rijden.

Het onderzoek

De verpleegkundige roept u binnen in de kleedkamer, waar u het bovenlichaam ontbloot. Tijdens het onderzoek ligt u op een aangepaste tafel.

De dokter zoekt via echografie het letsel in de borst op. De borst wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd met een kleine prik.

Daarna wordt het letsel aangeprikt met een speciale naald. Dit is bijna pijnloos: u voelt alleen het schokje en hoort een luide knal op het ogenblik van de biopsie. Op deze manier worden twee of drie biopsieën genomen.

Na de punctie wordt het wondje wat aangedrukt en wordt een verband aangebracht. Dit verband moet 24u op het wondje blijven. Gelieve dit verband ook droog te houden. Na het onderzoek moet u het gedurende 24u wat kalmer aan doen en geen zware arbeid verrichten.

Vacuümbiopsie onder mammografie

Bij een vacuümbiopsie plaatst de radioloog na een plaatselijke verdoving een naald in de borst. De arts kan zo weefsel (microverkalkingen) uit de borst nemen voor verder onderzoek in het laboratorium.

Vorbereiding

U mag GEEN bloedverduunners innemen. Informeer uw arts als u bloedverduunners inneemt. Na het onderzoek mag u NIET zelf met de auto rijden.

Het onderzoek

De verpleegkundige roept u binnen in de kleedkamer, waar u het bovenlichaam ontbloot. Tijdens het onderzoek ligt u in zijligging op een aangepaste tafel. Het is heel belangrijk om stil te liggen tijdens het onderzoek!

Er worden een paar foto's genomen. Onder plaatselijke verdoving plaatst de arts een naald en neemt zo enkele biopsieën.

Na het nemen van het weefsel uit de borst, wordt de biopsieplaats aangedrukt en dichtgekleefd met Steristrips®. Het wondje wordt afgedekt met een verband. Dit verband moet één week ter plaatse blijven en goed droog gehouden worden. Na die week mag u het verband en de Steristrips® zelf verwijderen.

Als u erge pijn heeft, mag u een pijnstiller nemen (type Dafalgan®). Neem GEEN aspirine, want dit is een lichte bloedverdunner!

Dit onderzoek kan enkel doorgaan in campus Aalst.

Vacuümbiopsie onder MR

Bij een MR geleide vacuümbiopsie wordt met een dunne lange naald een stukje weefsel uit de borst gehaald. Vooraf wordt er met MR een nauwkeurige plaatsbepaling gedaan van het letsel.

Vorbereiding

U mag GEEN bloedverdunners innemen.

Informeer uw arts als u bloedverdunners inneemt.

Vraag ook aan uw arts om een kalmeringsmiddel voor te schrijven. Dit mag u dan innemen op het moment dat u aankomt in het ziekenhuis. Breng ook een spannende bh mee en gebruik liever geen bodylotion.

Na het onderzoek mag u NIET zelf met de auto rijden.

Het onderzoek

Het onderzoek start op dezelfde wijze als een gewone MR-scan van de borsten. Alleen wordt op de verkregen beelden een nauwkeurige plaatsbepaling gedaan van het letsel. Het is heel belangrijk om stil te liggen tijdens het onderzoek.

De borst wordt ontsmet en plaatselijk verdoofd met een kleine prik. Daarna wordt het letsel aangeprikt met een speciale naald. Dit is bijna pijnloos. We maken een aantal keren een controle scan om er zeker van te zijn dat de naald zich in de regio van het letsel bevindt. Vervolgens zal de radioloog starten met het nemen van het biopt. Dit gebeurt met een toestel dat een zoemend geluid maakt. Als laatste maken we nog een controlescan.

Als het onderzoek afgelopen is, wordt de biopsieplaats aangedrukt en dichtgekleefd met Steristrips®. Het wondje wordt afgedekt met een verband. Dit verband moet één week ter plaatse blijven en goed droog gehouden worden. Na die week mag u het verband en de Steristrips® zelf verwijderen. Probeer om gedurende twee dagen geen zware voorwerpen te heffen. Bij pijn mag u Dafalgan® nemen. Neem GEEN aspirine, want dit is een lichte bloedverdunner!

Dit onderzoek kan enkel doorgaan in campus Aalst.

Resultaten van het onderzoek

Afhankelijk van het type onderzoek, ontvangt de aanvragende arts het resultaat meestal na een drietal werkdagen.

Het is aan de aanvragende arts om u het resultaat van het onderzoek mee te delen.

Meer inlichtingen hieromtrent kan u inwinnen op het secretariaat van Medische Beeldvorming.



Biopsie van de borst onder medische beeldvorming

OLV Ziekenhuis

Dienst Medische Beelvorming

Campus Ninove

Biezenstraat 2

9400 Ninove



Contact

T. 054 31 20 10

F. 054 31 20 15

E-mail: mbv.ninove@olvz-aalst.be